

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر
حل العناهج الدراسية بشكل متميز لترقي ب مجال التعليم
على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة
لجميع الفراغات التعليمية المختلفة



"ملخص كيمياء ٣"
إعداد الطالب / عبد الله أديب بخار
ثانوية مأرز الإيمان
ashraf واعتماد المعلم / عبد القادر بادي الأزهري
ثانوية أحد



gas

خواص الغازات:

<ul style="list-style-type: none"> الغازات دائماً في حركة مستمرة ، لذلك تطبق نظرية الحركة الجزيئية للغازات جسيمات الغاز تحتوي على طاقة كامنة ، لهذا السبب تتحرك + نظرية الحركة الجزيئية. تعتمد قوة التجاذب والتنافر في الغاز ، علـلـ لأن الفراغات بين الجسيمات كبيرة الغازات تتصادم فيما بينها تصادم من دون أي أن الجسيمات لا تفقد طاقتها الحركية عن التصادم 	<ul style="list-style-type: none"> تمدد بالحرارة لها خاصيـة الانتشار و التدفق كتافتها منخفضة ، علـلـ لأن جسيماتها متباعدة قابلة للانضغاط جسيماتها صغيرة
--	--

على ماذا تعتمد نظرية الحركة الجزيئية ؟

طاقة الجسيـم .

حركة الجسيـم .

حجم الجسيـم .

قانون طاقة الجسيـم :

$$KE = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

الانتشار: دخـالـ الغازات مع بعضـها البعض

التدفق: خـروـجـ الغاز من فتحـةـ صـغـيرـةـ جداـ (ثقبـ) إـلـىـ الهـوـاءـ الجـوـيـ وـمـنـ ثـمـ يـنـتـشـرـ

الطاقة الحركية

كتلة الجسيـم

سرعة الجسيـم

يعتمـدـ عـلـىـ سـرـعـةـ وـ كـتـلـةـ الجـسـيـمـ

قانون جراهام للانتشار:

قانون جراهام للتدفق:

سرعة التدفق تتناسب عـكـسـيـاـ معـ الجـذـرـ التـرـيـبيـعـيـ لـلـكتـلـةـ المـوـلـيـةـ لـلـغـازـ

$$\text{معدل التدفق} \propto \frac{1}{\sqrt{\text{كتلة المولية}}}$$

$$\frac{\text{معدل انتشار } A}{\text{معدل انتشار } B} = \sqrt{\frac{\text{كتلة المولية } A}{\text{كتلة المولية } B}}$$

مثال ١-١ ص ١٥

Hydrogen 1 H 1.008	
Nitrogen 7 N 14.007	

المطلوب : نسبة معدل الانتشار = ??	المعطيات : A الكتلة المولية للأمونيا = $17 \text{ g/mol} = \text{NH}_3$ B الكتلة المولية للكلوريد الهيدروجين = $36 \text{ g/mol} = \text{HCl}$
$\sqrt{\frac{36}{17}} = 1.46$	الحل: $\frac{\text{معدل الانتشار}}{\sqrt{\frac{\text{الكتلة المولية}}{\text{الكتلة المولية}}}} = \frac{B}{A}$

كيفية حساب الكتلة المولية :

كتلة النيتروجين الذرية = ١٤ . ٠ . ٧

مثال: NH_3

كتلة الـ H الذرية = ١ . ٠ . ٨

الكتلة المولية للأمونيا = $(14 \times 1) + (1 \times 3) = 17$

✿ الضغط:

قانون دالتون للضغط الجزئي للغازات:

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

• من أثبت وجود الضغط ؟

العالم الإيطالي تورشلي

• ما هو الضغط وكيف نشأ؟

هو القوة الواقعة على وحدة المساحة ، نشأ نتيجة

تحرك الغاز في الغلاف الجوي

• أجهزة قياس الضغط:

١) بارومتر : لقياس الضغط الجوي

٢) مانومتر : لقياس الغاز المحصور

٣) باسكال: قياس القوة على المساحة

✿ ملاحظة:

يعتمد قانون دالتون على الضغوط
الجزئية ، لا على الغازات المختلفة

✿ ملاحظة:

يعتمد الضغط الجزئي للغاز على عدد
مولاته و حجم الوعاء و درجة حرارة
خليل الغاز ، ولكنه لا يعتمد على
نوع الغاز

✿ ملاحظة:

١ ضغط جوي يقابل ٧٦٠ ملم من
عاصفة الزئق

مسائل تدريبية:

<p>القانون المستخدم : قانون معدل التدفق ص ١٤</p> <p>الحل:</p> <p>كتلة N_2 المولية = $28 = 14 \times 2$ / كتلة Ne المولية = $20 = 20 \times 1$</p> $\frac{\sqrt{7}}{14} = \frac{1}{\sqrt{28}} = Ne = N_2$ $\frac{\sqrt{5}}{10} = \frac{1}{\sqrt{20}}$ <p>معدل تدفق N_2 و Ne</p>	<p>سؤال ١ / صفحة ١٥</p> <p>المعطيات:</p> <p>Ne</p> <p>N_2</p> <p>المطلوب :</p> <p>الكتلة المولية لـ N_2 و Ne</p> <p>معدل التدفق لـ N_2 و Ne</p>
<p>القانون المستخدم : قانون معدل الانتشار</p> <p>الحل:</p> <p>الكتلة المولية لـ CO = $(16 \times 1) + (12 \times 1)$</p> <p>الكتلة المولية لـ CO_2 = $(16 \times 2) + (12 \times 1)$</p> $1.3 = \sqrt{\frac{44}{28}}$ <p>معدل الانتشار = CO_2 و CO</p>	<p>سؤال ٢ / صفحة ١٥</p> <p>المعطيات:</p> <p>أول أكسيد الكربون CO</p> <p>ثاني أكسيد الكربون CO_2</p> <p>المطلوب :</p> <p>الكتلة المولية لـ CO و CO_2</p> <p>معدل انتشار CO_2 و CO</p>
<p>الحل:</p> <p>$P_{total} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$</p> <p>$P_{total} = P_1 + P_2$</p> <p>$P_2 = P_{total} - P_1$</p> <p>$P_2 = 600 - 439 = 161$</p>	<p>المعطيات:</p> <p>الضغط الكلي = $600 = P_{total}$</p> <p>الضغط الجزيئي للهيليوم = $P_1 = 439$</p> <p>المطلوب :</p> <p>الضغط الجزيئي للهيدروجين = $P_2 = ?$</p>


✎ قوة التجاذب

↳ مقدمة: الاختلاف في قوى التجاذب ينبع عنه اختلاف في حالات المادة سائل - صلب - غاز


هناك قوتان في الجزيئات :

- (١) داخلية: داخل الجزيء
 - أ. رابطة أيونية ب. رابطة فلزية ج. رابطة تساهمية
- (٢) خارجية: خارج الجزيء
 - أ. تشتت ب. قطبية ثنائية ج. هيدروجينية H


غاز
الجسيمات متبااعدة



سائل
متراصة بانتظام



صلب
متراصة عشوائياً



١. قوى التشتت:

- قوة ضعيفة ، نتجت عن إزاحة الإلكترونات بشكل مؤقت .
- تنشأ بعد إزاحة الإلكترونات قوة ثنائية القطب

↳ متى تزداد قوة التشتت ؟



تزداد بزيادة الحجم الذري (عدد الإلكترونات في الذرة)

↳ أيهما أعلى في قوة التشتت ؟ اليود I₅₃ أم البروم Br₃₅ ، على .

الليود ، لأن حجمه أكبر


ملاحظة:

قوى التشتت تنشأ في المركبات غير القطبية



القوه هنا اصلية نشأت دون إزاحة للإلكترونات

قوه تجاذب



٢. القوه ثنائية القطب:

- التعريف: تجاذب بين منطقتي مختلفتي الشحنة — دون إزاحة للإلكترونات.

- الرابطة القطبية أقوى من رابطة التشتت

- تشاًقط في المركبات القطبية ، مثل: HCl حمض الكلور و HF، حمض الفلور.

ملاحظة :

الجزيئات القطبية الصغيرة تحتوي على قوى ثنائية قطبية عاليه

٣. الرابطة الهيدروجينية H

- تشاًعندما تقع ذرة هيدروجين بين ذرتين ذات كهروسالبية عاليه و بها أزواج إلكترونات حرة
- الفلور F ، الكلور Cl ، أوكسجين O ، نيتروجين N عناصر ذات كهرو سالبية عاليه
- علل. الرابطة H في جزيء الماء أقوى من الرابطة H في جزيء الأمونيا. لأن الكهروسالبية للأكسجين أكبر من الكهروسالبية للنيتروجين

ملاحظة :

الرابطة H أقوى من قوى التشتت و القوى ثنائية القطبية

المواد السائلة

• التماسك والتلاصق:

- التماسك: قوة ترابط الجسيمات المتماثلة .
- التلاصق: قوة ترابط بين الجسيمات الغير المتماثلة
- الخاصية الشعرية:
- انتقال الماء من الأسفل إلى الأعلى عبر أنابيب أسطوانية رفيعة
- مثال: جذور النبات أو المنديل عند امتصاص الماء
- تعتبر غازات السوائل من الموائع ، علماً لأن لها خاصيتي الانسياق و الانتشار
- اللزوجة: مقياس مقاومة السائل للتتدفق
- لأن جسيمتها متراصة و متربطة ومنتظمة ولا توجد بينها فراغات.
- التوتر السطحي: الماء
- الطاقة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل ، بمقدار معين
- تطبق النظرية الحركية الحزئية

التوتر السطحي:

- ﴿ كلما زادت قوة التجاذب بين الجسيمات ، زاد التوتر السطحي ﴾
- ﴿ التوتر السطحي للماء عالي ، علماً . ﴾
- لوجود الروابط الهيدروجينية المتعددة
- ﴿ تسير حشرة العنكبوت على سطح بركة الماء ، علماً لأن التوتر السطحي للماء عالي . ﴾

العوامل المؤثرة على اللزوجة

الحرارة

﴿ كلما زادت قلت اللزوجة ﴾


قوة تجاذب الجسيمات

﴿ كلما كانت قوة التجاذب أعلى كانت اللزوجة أعلى ﴾

حجم وشكل الجسيمات

﴿ السلال الطويلة والأحجام ﴾

الكبيرة تكون لزوجتها عالية



﴿ عند وضع الماء في أنبوب نلاحظ أن الماء يأخذ شكل ت-curve الأنابيب في الأعلى ، علماً . ﴾




لأن قوة التماسك أقل من قوة التلاصق


☞ المواد الصلبة

<p>مقدمة في الكيمياء</p> <p>المواد الصلبة</p> <p>المواد الصلبة البلورية</p> <p>المواد الصلبة غير البلورية</p> <p>المواد الصلبة التساهمية الشبكية</p> <p>المواد الصلبة الجزيئية</p> <p>المواد الصلبة الذرية</p>	<p>• مقيدة الحركة ، بسبب التجاذب العالي بين جسيماتها</p> <p>• المواد الصلبة البلورية (لها شكل هندسي منتظم) ، وحدة البناء هي أساس الشكل البلوري الهندسي.</p> <p>• المواد الصلبة غير المتمبلورة :</p> <ul style="list-style-type: none"> ١. مواد لا يوجد بها تنظيم للجسيمات وبالتالي لا يوجد ترتيب هندسي ٢. درجة انصهارها عالية ، ويتم تبریدها بشكل عالي ، مما يجعلها لا تكون الشكل البلوري. 	<p>• حركة ثابتة : اهتزازية</p> <p>• لا تعدد المواد الصلبة من المواقع ، علل. لأن ليس لها خاصيتي الانتشار والانسياط.</p> <p>• الكثافة:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١. الماء: الشاق يطفو على الماء ، لأن كثافته أقل من كثافة الماء. ٢. البنزين: البنزين الصلب كثافته أعلى من البنزين السائل ، لذلك يغرق في البنزين السائل
---	--	---

تغيرات المادة الفيزيائية

طاردة للطاقة (تفقد)	تمتص الطاقة (تكتسب)
(تكثف) سائل ← غاز • (تجمد) سائل ← صلب • (ترسيب) صلب ← غاز •	(تبخر) غاز ← سائل • (انصهار) سائل ← صلب • (تسامي) صلب ← غاز •
التكثف: عندما تفقد الجسيمات الطاقة ، تقل سرعتها وبالتالي تتكون الروابط الهيدروجينية وعندما تحول من الحالة الغازية إلى السائلة. التجمد: الدرجة التي تحول فيها المادة السائلة إلى صلب بلوري. الترسيب: تحول المادة من الحالة الغازية إلى الصلبة دون المرور بالحالة السائلة.	التبخر: تحول المادة السائلة إلى غاز. الانصهار: الطاقة اللازمة لكسر القوى التي تربط جسيمات الشبكة البلورية. التسامي: تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة.
	

*التبخر السطحي:  يتبخر الماء الموجود على السطح ؛ لأن الترابط الداخلي أقوى من الترابط في السطح.	*الانصهار:  تنصهر بعض المركبات عند درجات حرارة ثابتة معروفة ؛ لأن لها تركيب ثابت ومنتظم.  بعض المركبات غير معروفة لها درجات حرارة ثابتة ؛ لأن لها تركيب غير منتظم (عشوائي)  $\text{ثلج} + \text{ماء} = \text{تنقل الطاقة من الأعلى حرارة إلى الأقل}$ ؛ لذلك يحصل الذوبان
---	--



الفصل الثاني الطاقة

<p>الطاقة: هي طاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى البارد.</p> <p>قياس الحرارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • السُّعْدُر (<i>cal</i>): كمية الحرارة اللازمة لرفع الحرارة درجة مئوية واحدة لجرام واحد من الماء. • الجول (<i>J</i>): هي وحدة عالمية تقدر بـ 0.239 cal للجول الواحد. • السُّعْدُر الغذائي (<i>Cal</i>): هي الطاقة الموجودة في المواد الغذائية. 	<p>تعريف الطاقة: هي القدرة على بذل الشغل أو إنتاج الحرارة.</p> <p>قانون حفظ الطاقة: الطاقة لا تقني ولا تستحدث - بمشيئة الله - وإنما تحول من شكل إلى آخر ، وتبقى ثابتة ومحفوظة.</p> <p>من أنواع الطاقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • طاقة الوضع (الطاقة المخزنة): الطاقة التي تعتمد على تركيب المادة أو موضع الجسم ، وتلعب دوراً في التفاعلات الكيميائية. • الطاقة الحركية: الطاقة الناتجة عن الحركة = $\frac{1}{2} m r^2$
<p>مثال توضيحي:</p> <p>مثال توضيحي: جول $4.184 =$ سُعْدُر $1000 \text{ cal} =$ سُعْدُر غذائي 1 Cal</p> <p>صغير \rightarrow \times \rightarrow كبير</p> <p>صغير \leftarrow \div \leftarrow كبير</p>	<p>مثال توضيحي:</p> <p>جول $4.184 =$ سُعْدُر $1000 \text{ cal} =$ سُعْدُر غذائي 1 Cal</p> <p>لتحويل من سُعْدُر غذائي إلى سُعْدُر نضرب في 1000</p> <p>لتحويل من سُعْدُر إلى سُعْدُر غذائي نقسم على 1000</p> <p>لتحويل من سُعْدُر إلى جول نضرب في 4.184</p>
<p>سؤال ١ صفحة ٥٩</p> <p>المعطيات: الطاقة بوحدة السعر الغذائي $142 \text{ Cal} =$</p> <p>المطلوب: مقدار الطاقة بوحدة السعر $\text{cal} = ?$</p> <p>الحل: نحو من سعر غذائي إلى سعر $142 \text{ Cal} \times 1000 = 142000 = 142 \times 10^3 \text{ cal}$</p>	<p>مثال ١-٢ / ص ٥٨-٥٩</p> <p>المعطيات: الطاقة بوحدة السعر الغذائي $230 \text{ cal} =$</p> <p>المطلوب: الطاقة بوحدة الجول $J = ?$</p> <p>الحل: نحو من سعر غذائي إلى سعر ثم إلى جول $230 \text{ Cal} \times 1000 = 230000 = 23 \times 10^4 \text{ cal}$ $(23 \times 10^4) \text{ cal} \times 4.184 = 962320 = 9.6 \times 10^4 \text{ J}$</p>
<p>سؤال ٢ صفحة ٥٩</p> <p>الحل: نحو من كيلوجول إلى جول بالضرب في 1000 $86.5 \text{ KJ} = 86.5 \times 10^3 \text{ J} = ?$</p>	<p>المطلوب: الطاقة بوحدة الجول $J = ?$</p> <p>المعطيات: الطاقة بوحدة الكيلوجول $86.5 \text{ KJ} =$</p>

<p>الحل: ماهي وحدة الحرارة النوعية؟</p> <p>النقطة التي تسبق C تمثل الظروف القياسية</p> <p>$J/g \cdot {}^\circ\text{C}$</p> <p>معادلة حساب الحرارة الممتصة:</p> $q = c \times m \times \Delta T$ <p>الطاقة الممتصة : q الحرارة النوعية : c</p> <p>الكتلة : m الفرق في درجة الحرارة : ΔT</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التعريف: كمية الحرارة اللازمة لرفع الحرارة درجة مئوية واحدة لكل جرام واحد من المادة .
<p>الحل: ماهي وحدة الحرارة النوعية؟</p> <p>النقطة التي تسبق C تمثل الظروف القياسية</p> <p>$J/g \cdot {}^\circ\text{C}$</p> <p>معادلة حساب الحرارة الممتصة:</p> $q = c \times m \times \Delta T$ <p>الطاقة الممتصة : q الحرارة النوعية : c</p> <p>الكتلة : m الفرق في درجة الحرارة : ΔT</p>	<p>الحل: ماهي وحدة الحرارة النوعية؟</p> <p>النقطة التي تسبق C تمثل الظروف القياسية</p> <p>$J/g \cdot {}^\circ\text{C}$</p> <p>معادلة حساب الحرارة الممتصة:</p> $q = c \times m \times \Delta T$ <p>الطاقة الممتصة : q الحرارة النوعية : c</p> <p>الكتلة : m الفرق في درجة الحرارة : ΔT</p>

الحرارة

قياس الحرارة:

- المُسّعر: جهاز معزول يستخدم لقياس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة.

المُسّعر نوعان:

١. المُسّعر الغذائي: يقيس الطاقة في المواد الغذائية.

٢. المُسّعر البوليستريني: ص ٦٤

الطاقة الكيميائية والكون:

- الكيمياء الحرارية: التغيرات المصاحبة للتفاعلات الكيميائية.

- الكون هو النظام + المحيط.

١. النظام: جزء من الكون تتم فيه التفاعلات الكيميائية

٢. المحيط: كل شيء ماعدا النظام

المحتوى الحراري:

- يرمز إلى الطاقة المنطلقة أو الممتصة من التفاعلات التي تحدث عن ضغط ثابت في بعض الأحيان بالرمز q_p .

• لتسهيل قياس أو دراسة تغيرات الطاقة التي ترافق تلك التفاعلات وضع الكيميائيون خاصية أسموها **المحتوى الحراري** و يعرف بأنه المحتوى الحراري للنظام تحت ضغط ثابت.

• **التغير في المحتوى الحراري:** هي كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في التفاعل الكيميائي ويسمى المحتوى الحراري (أو حرارة) التفاعل (ΔH_{rxn}) في الظروف القياسية وهي :

$$1 \text{ atm} = 1 \text{ atm}$$

$$25^\circ\text{C} = 25^\circ\text{C}$$

$$\Delta H_{rxn} = H_{final} - H_{initial}$$

سؤال ١٣ ص ٦٥

$$\Delta T = 46.6 - 20 = 26.6 \quad C = 4.184 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$$

$$q = 5650 \text{ J} \quad m = ??$$

الحل:

$$m = \frac{q}{C \times \Delta T} = 50.77$$

إذا كانت H للمواد الناتجة أكبر من H للمواد المتفاعلة: يكون التفاعل ماص للحرارة و تكون $+q$

إذا كانت H للمواد الناتجة أقل من H للمواد المتفاعلة: يكون التفاعل طارد للطاقة و تكون $-q$.

سؤال ١٤ ص ٦٤

$$q = C \times m \times \Delta T$$

$$q_{water} = 4.184 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \times 125 \text{ g} \times (29.3 - 25.6) = 1940$$

• كمية الحرارة التي اكتسبها الماء تساوي كمية الحرارة التي فقدها الحديد لذا

$$q_{\text{فلز}} = -q_{water}$$

• أوجد الحرارة النوعية للفلز و حدد أي الفلزات هو ، بالمقارنة مع قيم جدول ٢-٢.

$$C_{\text{فلز}} = \frac{-q_{\text{فلز}}}{m \times \Delta T}$$

• مقارنة القيم في الجدول ٢-٢

$$C_{\text{فلز}} = \frac{-1940 \text{ J}}{50 \text{ g} \times -85.7^\circ\text{C}} = 0.453 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$$

نلاحظ أن الفلز هو الحديد

المعطيات والمطلوب:

$$m = 90 \text{ g}$$

$$q = 25.6 \text{ J}$$

$$\Delta T = 1.18^\circ\text{C}$$

$$C = ??$$

الحل:

$$C = \frac{q}{m \times \Delta T} = 0.241 \text{ J/g} \cdot ^\circ\text{C}$$

المعادلة الكيميائية الحرارية

٤. حرارة التكثيف: ΔH°_{cond}

هي الحرارة المنطلقة لمول واحد من البخار.

٥. حرارة التجميد: ΔH°_{solid}

هي الحرارة اللازمة لتجميد واحد مول من السائل.

$$\Delta H^\circ_{vap} = -\Delta H^\circ_{cond}$$

$$\Delta H^\circ_{fus} = -\Delta H^\circ_{solid}$$



تدخل الحرارة



تمتص الحرارة



الجزئيات متباينة

• تخرج الحرارة

• طاردة للحرارة

• الجزيئات متقاربة



تعريفها: هي عبارة عن معادلة كيميائي موزونة توضح فيها التغيرات

الحرارية ΔT

أنواع التغيرات الحرارية:

١. حرارة الاحتراق ΔH°_{comb} : O_2

عندما تتفاعل المادة لمول واحد منها مع الأوكسجين ، تنتج لنا حرارة احتراق.

٢. حرارة التبخر ΔH°_{vap} :

الحرارة اللازمة لتغيير واحد مول من السائل.

٣. حرارة الانصهار ΔH°_{fus} :

الحرارة اللازمة لصهر واحد مول من المادة الصلبة.

٧٣ ص ٢٥

٧٣ ص ٢٣

المعطيات والمطلوب:

$$\Delta H^\circ_{cond} = -23.3 \quad m = 275g$$

الكتلة المولية للأمونيا = $(3 \times 1) + (14 \times 1) = 17$ مول / جرام

عدد المولات =؟؟ الطاقة المنطلقة عن تكثف ٢٥.٧ جرام من الأمونيا =؟؟

الحل:

$$\frac{m}{\text{الكتلة المولية}} = \frac{275}{17} \approx 16.2 \text{ mol}$$

إذا كانت ٢٣.٣ تكثف ١ مول من الأمونيا ، ما لكمية اللازمة لتكثيف ١٦.٢ مول ؟؟

باستخدام المعادلة التالية:

$$\frac{1}{-23.3} = \frac{16.2}{x} = \frac{16.2 \times (-23.3)}{1} = x = 377.36 \text{ kJ/mol}$$

لماذا يرش المزارعون الماء على التربة في الشتاء ؟؟؟

حتى تنطلق درجة حرارة الإنصهار ΔH°_{fus}

شرح قانون هس موجود في اليوتيوب

عنوان المقطع: استعمال قانون هس - كيمياء ٣

القناة: Easy chemistry

المعطيات والمطلوب:

كتلة الميثanol = g ٢٥.٧ الترسيب الكيميائي للميثanol

الطاقة اللازمة لصهر ١ مول من الميثanol = ٣.٢٢

الطاقة اللازمة لصهر ٢٣.٧ g من الميثanol = ؟؟

الحل:

$$(12 \times 1) + (1 \times 3) + (16 \times 1) + (1 \times 1) = 32 \text{ g/mol}$$

$$\frac{25.7}{32} = 0.8 \text{ mol}$$

٣) نجد الطاقة اللازمة لصهر ٠.٨ مول

$$\frac{0.8}{x} = \frac{1}{3.22} = x = 0.8 \times 3.22 = 2.6 \text{ kJ}$$

قانون هس:

مجموع التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الفردية = التغير في المحتوى الحراري للتفاعل النهائي.

الفصل الثالث سرعة التفاعل الكيميائي

المواد المتفاعلة [Δ]

Δt

معادلة متوسط سرعة التفاعل:



التغير في تركيز المواد المتفاعلة على التغير في الزمن.

ملاحظة:

يستخدم العلماء الاشارة السالبة عندما يقومون بحساب سرعة التفاعل بناءً على مقدار استهلاك المواد المتفاعلة.

نظيرية التصادم:

تصادم الجسيمات (الذرات أو الجزيئات أو الأيونات) بعضها البعض ، علّي يتم التفاعل الكيميائي.

في التمثيل البياني لسرعة التفاعل ، متى تزداد المواد الناتجة ؟
إذا قلت المواد المتفاعلة.

*سرعة التفاعل الكيميائي هي:

عبارة عن التغير في تركيز المواد المتفاعلة أو الناتجة في وحدة الزمن و يشار إليها بوحدة mol/L.s

المواد المتفاعلة أو الناتجة [Δ]

Δt

t = التغير في الزمن

[] = القوس الكبير يمثل التركيز بالمولارية (مول على لتر)

ملاحظة:

في التفاعل الطارد للحرارة تكون ΔH سالبة ، والعكس في الماصل.

عرف مالي:

(١) المعقد النشط: مجموعة ذرات ، فترة بقاءها معاً قصيرة جدًا ، قد ينتج عنها نواتج أو قد تعود إلى صورة المواد المتفاعلة.

(٢) طاقة التنشيط E_q : الحد الأدنى من الطاقة لدى الجزيئات المتفاعلة؛ لتكوين المعقد النشط وإحداث التفاعل.

(٣) المركب النشط: مركب غير مستقر ، يتكون لحظياً ، يمتلك طاقة عالية ، غير ثابت (له إحتمالين إما أن يصبح مركباً أو يعود لمرحلة المواد المتفاعلة).


*أنواع التصادم:

• تصادم مثمر : يحقق شروط التصادم .

• تصادم غير مثمر : لا يحقق شروط التصادم.

*شروط التصادم:

• الاتجاه المناسب والوضع المناسب بالنسبة للجسيمات المتصادمة.




• أن تمتلك الجسيمات المتصادمة طاقة التنشيط E_q

العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل

العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل:

٣) تركيز المواد المتفاعلة: علاقة طردية مع سرعة التفاعل.

بزيادة التركيز(الكمية)---> يزيد عدد الجسيمات المتصادمة ---> تزيد فرص التصادم ---> يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.



مساحة السطح تؤثر طردياً على سرعة التفاعل (كلما زادت المساحة زادت السرعة).

على. تحرق نشارة الخشب أسرع من قطعة الخشب؛ لأن مساحة السطح لنشرة الخشب أكبر من قطعة الخشب.

على. تصدأ برادة الحديد أسرع من قطعة الحديد؛ لأن مساحة السطح لبرادة الحديد أكبر من قطعة الحديد.

بـ-المثبتات: هي مواد تبطئ سرعة التفاعل دون أن تستهلك كمواد متفاعلة ولا تظهر كمواد ناتجة.

كيف يبطي المثبت سرعة التفاعل؟؟

بزيادة طاقة التنشيط Eq

مثال: المواد الحافظة و المواد المضادة للأكسدة.

العوامل المؤثرة على سرعة التفاعل:

١) طبيعة المواد المتفاعلة، وتعتمد على النشاط الكيميائي.

عند تفاعل النحاس والخارصين(الزنك) مع محلول نترات الفضة ، نلاحظ أن راسب الفضة الناتج من الخارصين أكبر من النحاس ، و تفاعل الخارصين مع نترات الفضة يحدث أسرع من النحاس ، علّل : لأن الخارصين أنشط كيميائياً.



على. النحاس والخارصين متباينان في الخواص الفيزيائية ؛ لأنهما متقارنان في الجدول الدوري والتوزيع الإلكتروني.

ملاحظة: العناصر الانتقالية تستقر عندما يتملي المستوى d بالكامل أو للنصف.

٢) الحرارة: علاقة طردية مع سرعة التفاعل.

بزيادة درجة الحرارة ---> تزيد حركة الجسيمات ---> تزيد فرص التصادم ---> يؤدي إلى زيادة سرعة التفاعل الكيميائي.

مثال: الثلاجة تبريد الأطعمة لتبطئ سرعة التفاعل وبالتالي تخفف سرعة التعفن مما يحفظ الأطعمة من التلف.

ملاحظة: للتبريد علاقة عكسية مع سرعة التفاعل.

٤) المحفزات والمثبتات:

أـ-المحفزات: هي مواد تزيد من سرعة التفاعل دون أن تستهلك كمواد متفاعلة ولا تظهر كمواد ناتجة.

كيف يزيد المحفز من سرعة التفاعل؟؟

بالقليل من طاقة التنشيط Eq

مثال: الانزيمات والهرمونات في جسم الإنسان

قوانين سرعة التفاعل

قانون سرعة التفاعل: حاصل ضرب كمية ثابتة في تركيز المادة المتفاعلة ، \bullet القانون العام لسرعة التفاعل:

إذا كان التفاعل من خطوة واحدة $A \rightarrow B$



القانون رياضيًا: $R = k[A]^m[B]^n$

القانون رياضيًّا: $R = k[A]$

حساب الرتبة $m+n$

$=$ التركيز بالمولارية للمواد المتفاعلة $[A]$

K = ثابت السرعة ، لكل تفاعل ثابت خاص به ويقاس بـ Mol/L

R = سرعة التفاعل وتقاس بـ $Mol/L \cdot s$

مقطع لشرح القوانين:

اسم القناة: أ. معاذ الشلال

$R = k \times [A]^a$ / أكتب قانون سرعة التفاعل الكيميائي: $aA \rightarrow bB$

اسم المقطع: رتبة التفاعل

مسائل الباب

ص ١٠٨




ص ٩٦

مثال ٣-١

ص ٩٦



ص ٩٥




ص ١١٠

٢٠ س

ص ١٠٩

جدول ٣-٢

ص ١٠٩ - ١٠٨



الرسوم البيانية لهذا الباب

ص ١٠٠ شكل ٣-٦

ص ٩٩ شكل ٥-٣

تمثيل بياني لتفاعل ماص للحرارة

تمثيل بياني لتفاعل طارد للحرارة

ص ١٠٦ شكل ٣-١١

ص ١٠٤ شكل ٣-١٠

أثر المادة المحفزة على سرعة التفاعل

أثر الحرارة على طاقة التنشيط / و سرعة التفاعل

صيغة السؤال:

رسم التفاعل الكيميائي عندما : يكون طارد للحرارة / ماص للحرارة مبينا المركب النشط ، طاقة التنشيط ، النواتج و المتفاعلات.

رسم تفاعل كيميائي أثنا عليه بالحرارة / بمادة محفزة.

العوامل المؤثرة على الاتزان الكيميائي

الكمية (التركيز)

ما أثر زيادة تركيز المواد المتفاعلة على كل من :

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد الناتجة :

الكمية: تقل المواد المتفاعلة وتزداد المواد الناتجة حتى تصل إلى الاتزان

Keq: ثابت بثبوت درجة الحرارة

ما أثر انقصاص تركيز المواد المتفاعلة على كل من :

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد المتفاعلة

الكمية: تقل المواد الناتجة وتزداد المواد المتفاعلة حتى تصل إلى الاتزان
الجديد

Keq: ثابت بثبوت درجة الحرارة

مبدأ لوتشاتليه:

عند وقوع قوة خارجية على نظام متنزن يقوم ذلك النظام بالاتجاه نحو الطرف الذي يعمل على امتصاص تأثير القوة.

العوامل المؤثرة على الاتزان الكيميائي:

- التركيز = المولارية [M] = الكميات
- الضغط والحجم
- درجة الحرارة الناتجة عن التفاعل.
- المادة الحافزة

إذا كانت مولات المواد الناتجة أكبر من المواد المتفاعلة ، فيزيادة الضغط على المواد الناتجة يحدث التالي:

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد المتفاعلة

الكمية: تقل المواد الناتجة وتزداد المواد المتفاعلة حتى تصل إلى الاتزان

Keq: ثابت بثبوت درجة الحرارة

الضغط والحجم (علاقة عكسية):

المتأثر بزيادة الضغط في التفاعل العكسي هو صاحب عدد المولات الأكبر من بين المواد المتفاعلة والناتجة.

ما أثر الزيادة في الضغط على المواد المتفاعلة لكل من :

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد الناتجة

الكمية: تقل المواد المتفاعلة وتزداد المواد الناتجة

Keq: ثابت بثبوت درجة الحرارة

المادة الحافزة:

لـ تزيد من سرعة التفاعل ، كيف ؟ بالتنازل من طاقة التنشيط *Eq*

لـ لا تؤثر على حالة الاتزان ولا على ثابت الاتزان ، علل. لأن التفاعل العكسي له سرعات أمامية وخلفية والمادة الحافزة تؤثر على السرعتين بنفس المقدار

ما أثر انقصاص الضغط على المواد المتفاعلة لكل من :

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد المتفاعلة


الكمية: تقل المواد الناتجة وتزداد المواد المتفاعلة حتى تصل إلى الاتزان

Keq: ثابت بثبوت درجة الحرارة

درجة الحرارة:

ملاحظة: حرارة التفاعل ΔH تعد مادة

(أ) تفاعل طارد للحرارة $-\Delta H$



توزيع الحرارة


١) رفعنا حرارة التفاعل إلى ٢٠ درجة ---> أصبح مجموع الحرارة ناحية المواد الناتجة ٣٠ ٢٠ ناحية المواد المتفاعلة.

٢) لوزن الحرارة نقسم حرارة المواد الناتجة (١٠) على ٢ = ٥

٣) نضيف ٥ على حرارة التفاعل الجديدة (٢٠) و ٥ على حرارة المواد المتفاعلة (٢٠)

أصبحت الآن = $20 + 5 \rightleftharpoons 25$

ب) التفاعل الماصل للحرارة ΔH



١) رفعنا حرارة التفاعل إلى ٢٠ درجة ---> أصبح مجموع الحرارة ناحية المواد المتفاعلة ٢٠ لـ ٣٠ ناحية المواد الناتجة.

٢) وزن الحرارة نقسم حرارة المواد المتفاعلة (١٠) على ٢ = ٥

٣) نضيف ٥ على حرارة التفاعل الجديدة (٢٠) و ٥ على حرارة المواد الناتجة (٢٠) أصبحت الآن = ٢٥

ما أثر زيادة الحرارة في التفاعل الماصل على كل من:

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد الناتجة

الكمية: تقل المواد الناتجة و تزداد المواد المتفاعلة

Keq: أكبر من الواحد

ما أثر زيادة الحرارة في التفاعل الطارد على كل من:

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد المتفاعلة

الكمية: تقل المواد الناتجة و تزداد المواد المتفاعلة

Keq: أقل من الواحد علّل ، لأن تركيز المواد الناتجة أقل من تركيز المواد المتفاعلة ، بمعنى آخر لأن البسط أقل من المقام

ما أثر انقصاص الحرارة (تبديد) في التفاعل الطارد على كل من:

اتجاه التفاعل: يكون نحو المواد الناتجة

الكمية: تقل المواد المتفاعلة و تزداد المواد الناتجة

Keq: أكبر من الواحد علّل ، لأن تركيز المواد المتفاعلة أقل من تركيز المواد الناتجة ، بمعنى آخر لأن المقام أقل من البسط

استعمال ثابت الاتزان

توقع الرواسب:

Ksp: حاصل الذوبانية

Qsp: الحاصل الأيوني وهو قيمة تجريبية للمقارنة مع

الاحتمالات:

• إذا كان **Qsp** أكبر من **Ksp**

يكون محلول غير مشبع ؛ لذلك لا تكون راسب

• إذا كان **Qsp = Ksp**

لا يحدث تغير ، **علل** ؛ لأنهما متساويان

• إذا كان **Qsp < Ksp** أصغر من

يحصل ترسب للمحلول المشبع

تأثير الأيون المشترك:

ملاحظة : الأيون المشترك يخفف الذوبانية.

الأيون المشترك: هو أيون مشترك بين اثنين أو أكثر من المركبات الأيونية.

تأثير الأيون المشترك: انخفاض ذوبانية المادة بسبب وجود أيون مشترك.

ثابت حاصل الذوبانية:

علل. تواجد الأملاح بكثرة في البحار والمحيطات وبعض البحيرات ؛ بسبب الذوبانية العالية (الكلوريد الصوديوم = الملح = $NaCl$)

B4S04: كبريتات الباريوم

$B4^{++}$ ---> مادة سامة لكنها آمنة **إذا** أخذت بتركيز ضعيف 10^{-5} ، فيم تستخدّم ؟ يجب أن يشربها المرضى قبل عمل الأشعة السينية المستخدمة في فحص الجهاز الهضمي.

ملاحظة: تكون تراكيز الأيونات صغيرة إلى أقصى حد.

تعريف حاصل الذوبانية:


هو حاصل ضرب تراكيز الأيونات الذائبة كل منها مرفوع لأس يساوي معامله في المعادلة الكيميائية.

ملاحظات:

- تعتمد قيمة **Ksp** (ثابت حاصل الذوبانية) على تراكيز الأيونات في محلول المشبع.

- بعض الأملاح تكون شحيحة الذوبانية (قليلة الذوبان)

تابع تأثير الأيون المشترك:



= محلول مائي

كيف أتخلص من أيونات الرصاص Pb^{++} الناتجة عن التفاعل؟


عند إضافة الزيادة من الكرومات يوجه التفاعل ناحية المواد المتفاعلة (ترسيب)، علل؛ لأن الكرومات أيون مشترك وبالتالي يعمل على تقليل الذوبانية زوجيه التفاعل ناحية المواد المتفاعلة، وبذلك لا يتخلل الرصاص إلى مواد ناتجة.

على حسب مبدأ لوتشاتليه يتجه التفاعل ناحية المواد المتفاعلة وبالتالي يخفف ذوبان الرصاص أو أيون الرصاص Pb

﴿مسائل هذا الباب:

ص ١٤٣ س ١٨ فقرة a.b.c	ص ١٤٢ حساب التراكيز عن الاتزان	س ٢ ص ١٢٩
ص ١٤٧ س ٢٢ فقرة a	ص ١٤٩ مثال ٧-٤	س ٤٥ ص ١٣٣

❸ علل لماذا لا يؤثر الاتزان على التفاعل التالي؟








لأن عدد المولات متساوي

✿ إضاءة: الميثان والإيثان يوجدان في الحالة

الغازية، علل؛ لأن وزنها الجزيئي صغير.


الفصل الخامس مشتقات المركبات الهيدروكربونية وتفاعلاتها

<p>الحالات الأولية: هي ذرة هالوجين مرتبطة بحلقة بنزينأو مجموعة أromاتية (عطرية)</p> <p>مثال:</p> <p>قبل إضافة الكلور: بنزين</p> <p>بعد إضافة البنزين: كلورو بنزين</p> <p>تساؤل:</p> <p>ماذا تمثل الدائرة؟</p> <p>تمثل الرابطة المزدوجة</p> 	<p>المجموعة الوظيفية: هي عبارة عن ذرة واحدة أو مجموعة ذرات مرتبطة مع بعضها البعض بذرة الكربون الأليفاتية أو سلسلة كربونية (حلقية).</p> <p>الحالات الكيل: R-X</p> <p>X = عناصر المجموعة 17 (الهالوجينات) ، مثل: اليود والبروم والكلور وهي أحاديث التكافؤ (تحتاج إلى الكترون واحد لتصبح إلى حالة الاستقرار)</p> <p>R = الجذر الكيلي أصله كان (ميثان-إيثان...) لكن انزع منه ذرة هيدروجين.</p> <p>تعريفها: ذرة هالجين تحمل محل ذرة الهيدروجين في الكان (ميثان-إيثان...)</p> <p>أمثلة على العجذور الكيلي: $\text{CH}_3/\text{C}_2\text{H}_5/\text{C}_3\text{H}_7$</p> 
<p>تابع الأمثلة:</p> <p>(١، ١، ١)-ثلاثي كلورو-إيثان</p> <p>١-برومو-٢-كلورو-إيثان</p> <p>١-برومو-٢-كلورو-إيثان</p> <p>بدأتنا الترقيم من البروم؛ لأننا اعتمدنا على الترتيب الأبجدي ، في حالة تعدد المجموعات</p>	<p>تسمية حاليدات الكيل: R-X</p> <ul style="list-style-type: none"> نختار أطول سلسلة مستمرة؛ لتحديد اسم الكان نبدأ بأقرب تقع يوح به الهالوجين من السلسلة الهيدروكربونية. عند تسمية الهالوجين نضيف حرف الواو إلى نهايته ، مثل: كلور \leftarrow كلورو. يختم المركب باسم الكان. <p>أمثلة:</p> <p>(١، ١، ١)-ثنائي كلورو-إيثان</p> <p>١-كلورو-إيثان</p> <p>١-برومو-٢-كلورو-بنزين</p> 
<p>(١، ١، ١)-ثلاثي كلورو-إيثان</p> <p>مستويات الطاقة الرئيسية</p>	<p>الخواص الفيزيائية لهاليدات الكيل:</p> <p>عمل؛ لأن عدد مستويات الطاقة يزيد وبالتالي يزيد الذرة أسفل المجموعة تزداد عند الانتقال إلى أعلى المستويات</p> <p>الكهروسالبية تقل عند النزول إلى أسفل المجموعة ، عمل؛ لأن حجم الذرة يزداد.</p> <p>درجة الغليان</p> <p>الكتافة</p> <p>حجم</p>
	

<p>يحضر هاليد الكيل من ألكان المناسب.</p> <ul style="list-style-type: none"> حضر كلورو بنزين: $\text{C}_6\text{H}_6 + Cl_2 \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_5Cl + HCl$  <p>حضر ١،٢-كلورو-بنزين:</p> $\text{C}_6\text{H}_6 + 2Cl_2 \rightleftharpoons \text{C}_6\text{H}_4Cl_2 + HCl$ 	<p>يحضر هاليد الكيل من ألكان المناسب.</p> <ul style="list-style-type: none"> حضر كلوريد الميثيل: $CH_4 + Cl \rightleftharpoons HCl + CH_3Cl$ <ul style="list-style-type: none"> حضر بروميد الإيثيل: $C_2H_6 + Br_2 \rightleftharpoons C_2H_5Br + HBr$
<p>كيف تحضر الكحول من هاليدات الكيل ؟</p> <p>بإضافة OH</p> <p> تكون هاليدات الكيل روابط ثنائية القطب مؤقتة ، علل ؛ لأن R موجبة و X سالبة.</p> <p> تعد هاليدات الكيل مذيبات عضوية ، علل ؛ لأنها تذيب الشحوم والدهون.</p>	<p>ما هي الطريقة التي يستخرج بها الكحول من هاليد الكيل ؟</p> <p>بإضافة مجموعة الهيدروكسيل OH</p> <p> ما هي الطريقة التي يستخرج بها الأمين من هاليد الكيل ؟</p> <p>بإضافة مجموعة النشادر NH3</p>
<p>ما هي الهليجنة ؟</p> <p>تفاعل تحل فيه ذرة هالوجين محل ذرة هيدروجين.</p> <p>ما هي استعمالات هاليدات الكيل ؟</p> <p>1-منظفات للشحوم والزيوت 2-صنع البلاستيك 3-صنع نماذج الألعاب</p>	<p>اكتب الصيغة البنائية لمركب : ٢-برومو-٢-كلورو - (١،١،١) ثلثي - فلورو - إيثان ، الذي يستخدم في التخدير.</p> $\begin{array}{c} Cl & F \\ & \\ Br - C - C - F \\ & \\ 2 & 1 \end{array}$

الكحولات والائيثرات والأمينات

R-OH : الكحولات




تسميتها:

١) اختار أطول سلسلة مستمرة تحدد الakan


٢) يتم الترقيم من الطرف الأقرب للتفرع

٣) إذا وجدت مجموعات متكررة نصلق كلمة ثنائي ، ثلاثي ...


٤) يضاف حرف الواو والنون إلى نهاية الakan المناسب



١-بروبانول



(١،١) ثنائي - بروبانول




(٢،٢) ثنائي - بروبانول

- الرابطة**
- OH المجموعة الوظيفية: مجموعة الهيدروكسيل OH من خواصها أنها عالية السالبية ، علل : لوجود ذرة الأكسجين الروابط المتركة: روابط تساهمية متوسطة قطبية.
- أمثلة:**
- ١-الميثanol وهو أبسط الكحولات ومضر .
- ٢-الإيثانول غير ضار وينتج من تخمر السكريات ، يستخدم في التعقيم ، يضاف إلى البنزين لعملية التحسين ، ويعتبر مادة أولية لتحضير المركبات العضوية .
- خواص الكحولات:**
١. زاوية الكحول مشابهة لزاوية الماء = ١٠٤.٥ ، علل : لأنهما يتشاركان في التركيب ولوجود الزوج الإلكتروني الحر .
٢. درجة غليان الكحول أعلى من درجات غليان الألكانات المماثلة لها في الكثافة المولية ، علل : لوجود مجموعة الهيدروكسيل OH .
٣. عملية الامتزاج : يحصل لها امتزاج كامل مع الماء ، علل : لأن الماء مركب قطبي والكحول قطبي فيحصل الامتزاج ، طريقة الفصل : يفصل عن طريق التقطر ، علل : لحصول امتزاج تام .
٤. تعتبر الكحولات مذيبات قطبية ، علل : لأنها مركبات قطبية ، والمذيبات تذيب أشباهها .
٥. يستخدم الجليسروول في منع تجمد وقود الطارة

● يستخدم الجليسروول في منع تجمد وقود الطارة

هكسانول حلقي

مركب سام يستخدم في
المبيدات الحشرية



* الأمينات : R-NH₂

أنواع الأمينات:

١) أمين أولي ٢) أمين ثانوي ٣) أمين ثالث

خواص الأمينات:

* أصل الأمينات نشادر NH_3 لها الصفة القاعدية

* ذرة النيتروجين يوجد بها زوج إلكترون حر حسب قاعدة لويس، علل؛ لأنها قاعدية.

التسمية:


أمينو + الجذر الكيلي أو الجذر الكيلي + أمين

مثال:

$\text{CH}_3\text{-NH}_3$ ← أمينو ميثيل أو ميثيل الأمين

$\text{C}_2\text{H}_5\text{-NH}_3$ ← أمينو إيثيل أو إيثيل الأمين

في حالة تعدد الأمين:



(١) إيثان ثنائي الأمين



(٢) إيثان ثالثي الأمين

* الإيثرات : R-O-R

ما الفرق بين الإيثرات والكحول؟

ذرة الهيدروجين في الكحول استبدلت بمجموعة R في الإيثر.

خواص الإيثرات:

١) مذيبات عضوية، علل؛ لأنها مركبات قطبية.

٢) سريعة التطاير، علل؛ لأن ترابطها ضعيف.

٣) درجة غليانها أقل من الكحولات المماثلة لها في الكتلة الجزيئية، علل؛ لأن قطبيتها ضعيفة.

٤) مركبات قطبية أقل من الكحولات، علل؛ لوجود مجموعة الكيل في الإيثر محل H في الكحولات.

تسمية الإيثرات:

اسم الجذور الكيلية + إيثر

مثال:


١. في حالة تشابه الجذور :

$\text{CH}_3\text{-O-CH}_3$: ثالثي - ميثيل - إيثر

٢. في حالة اختلاف الجذور : ترتيب هجائياً:


$\text{CH}_3\text{-O-C}_2\text{H}_5$: إيثيل - ميثيل - إيثر

$\text{N}(\text{H}_2)_2$



الأنيلين (الأصباغ)


$\text{N}(\text{H}_2)_2$



هكسيل حلقي أمين

صناعة المبيدات الحشرية


٥) تعد رائحة الأمينات غير مقبولة من قبل الإنسان ، والأمينات هي المسؤولة عن الكثير من الروائح المميزة للكائنات الميتة و المتحللة




الصيغة العامة
لمركبات الكربونيل

كل مركبات الكربونيل كل


تقسم مركبات الكربونيل إلى:



(٣) الأحماض الكربوكسيلية:



(٢) الكيتونات:




(١) الألدهيدات:


*** الألدهيدات:**
خواص الألدهيدات:
١) مركبات قطبية نشطة في التفاعل ، علل ؛ لوجود الأكسجين المتمثل في مجموعة الكربونيل.
٢) تذوب في الماء ، علل ؛ لأنها قطبية فتكون روابط H مع الماء.
٣) الألدهيدات أقل ذوبانة في الماء من الكحولات والأمينات ، علل ؛ لأنها أقل قطبية من الكحولات والأمينات.
٤) لا يستطيع تكوين روابط H بين جزيئاته ، علل ؛ لأن ذرة الهيدروجين لا تقع بين ذرتين ذات كثافة سالبة عالية لتكون الرابطة H

*** الألدهيدات:**
التسمية: اسم ألكان + الـ
أمثلة:
 ميثانال ، الاسم الشائع له هو الفورمالديهيد
 إيثانال ، الاسم الشائع له هو الاستالدالديهيد

كون رابطة H تربط الماء بالألدهيدات:




*** الألدهيدات:**
متى تتكون الألدهيدات ؟
عندما ترتبط مجموعة الكربونيل بذرة هيدروجين وتكون مجموعة الكربونيل طرفية (نهاية السلسلة الكربونية)



طرفية

على أحياناً تستخدم الأسماء الشاعنة للمركبات لأنها أسهل في التواصل و تكون مألوفة لدى الكيمياء.



بنزالديهيد ، له رائحة اللوز

*** ملاحظة :**

- لا يحتوي على ذرة هيدروجين.
- الأكسجين يحاط بأربع إلكترونات.

*** ملاحظة : الألدهيدات أعلى قطبية من ألكان ،**

علل ؛ لأنه يحتوي على ذرة هيدروجين

للوصول إلى حالة الاستقرار

*** تساؤل : ما معنى مشع ؟ ؟**

لا ينقصه ذرة هيدروجين

الكيتونات:

الخواص:

١) أقل قطبية من الألدهيدات ، علل : لاستبدال الهيدروجين بمجموعة الكربونيل و الجذر الكيلي.

٢) الذوبان في الماء أقل من الألدهيدات ، علل : لأنها أقل قطبية

٣) لا يكون روابط H بين جزيئته ، علل : لأنه لا يقع بين ذرتين عالية الكهرو سالبية.

٤) يكون روابط H مع الماء ، علل : لأنه الماء يحتوي على هيدروجين حمضي.

٥) تتشابه الألدهيدات و الكيتونات في الخواص الفيزيائية و الكيميائية ، علل : لأنهما متشابهان في التركيب الكيميائي.

٦) تعد مذيبات شائعة للمواد القطبية المعتدلة.


٧) وسط السلسلة الكربونية

ملاحظة


الأسيتون لا يذوب في الماء أبداً ، علل : لأنها مركب غير قطبي.

التسمية:


تحديد موقع مجموعة الكربونيل (بالترقيم)+اسم المكان +ون




٢-بروبانون




٣-كلورو-٢-بيتانون



حمض- إيثانويك / حمض الخل



٢- كلورو-١-بروبانويك



حمض- الميثانويك

الأحماض الكربوكسيلية:

الخواص:

١) قطبية الأحماض العضوية عالية ، علل : لوجود مجموعتي الكربونيل و الكربوكسید.


١) تذوب بسرعة في الماء ، علل : لأنها تكون روابط H او قطبيتها عالية.

٢) يكون روابط H بين جزيئته .


٣) طرفية

التسمية:


كلمة (حمض)+اسم المكان +ونيك



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل



حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل




حمض- إيثانويك / حمض الخل






رسم الرابطة الهيدروجينية بين جزيئات الأحماض الكربوكسيلية:



ملاحظة: الأحماض تتأين (تنقسم إلى أيون موجب وسالب) عند وضعها في الماء

معادلة تأين الحمض في الماء:



تم الانتهاء من تلخيص منهج الكيمياء بفضل الله

متهنين لكم التوفيق و النجاح

محبكم عبد الله أديب نجار