

1- أكثر العجيبات الشاذة شيوعاً هو: a- المحن الجديهي b- المحن المعترض c- المحن المعقدي d- المحن الوحشي	2- في أي عمر حمل يستفسي السكري الحمن روثنيا؟ a- 12 weeks b- 36 weeks c- 18 weeks d- 28 weeks
3- يستبدل الثلبا بالحبب حوالي اليوم --- من الإرضاء: a- الثاني b- الرابع c- السادس d- الأول	4- بعد الولادة، يصبح الرحم عضواً حوضياً في الحالة الطبيعية بعد: a- 12 hours b- 7 days c- 10 days d- 3 weeks
5- بوضع تشخيص الحمل المتعدد عادةً بـ ---: a- الفحص الحوضي b- قياس ارتفاع قعر الرحم c- مناورات Leopold d- التصوير بالأشعة فوق الصوتية	6- السبب الأكثر شيوعاً لنزوف الخلاص هو: a- رضوض وتمزقات الغشاء التناسلية b- عذلة (وهن) الرحم c- انحناس بقايا مشيمة d- اضطرابات النخر
7- مقارنة مع السيدات غير الحوامل قبل خطر النخر النصفي خلال الحمل: a- لا يكثر بالحمل b- يزداد خلال الحمل والنفاس c- ينقص خلال الحمل والنفاس d- يزداد خلال الحمل وينقص في النفاس	8- أكثر ما يحدث عبور لكريات حمر جنينية إلى الدوران الوالدي بعد: a- الإجهاض العفوي b- بعد انشقاق الأغشية المبكر c- بعد المخاض والولادة d- بعد الحمل الهاجر
9- يتضمن اختبار الشدة بالتقصص اشكاً واحداً من المؤشرات الآتية لمعدل قلب الجنين وهو: a- نقص في معدل ضربات قلب الجنين كحواب على تنفس الأم b- زيادة في ضربات القلب كحواب على تغير في وضعية الأم c- نقصاً في معدل ضربات قلب الجنين كحواب على التقلصات d- زيادة في ضربات قلب الجنين كحواب على حركته	10- فيما يخص الصرع كل ما يلي صحيح عدا: a- يمكن أن يرافق العلاج بمضادات الاختلاج حدوث تشوهات جنينية b- تعاني أكثر من ثلثي المريضات الحوامل المصابات بالصرع من زيادة في حدوث الاختلاجات خلال الحمل c- لا يُعد الإرضاع مضاداً استطباباً عند اللواتي يتناولن أدوية مضادة للاختلاج d- تنقص الحاجة من جرعة الأدوية المضادة للاختلاج بعد الولادة

11- أي الأعراض الآتية تستدعي استئصال حبة الجنين عند سيدة 23 عام، حامل، عديدة ولادة، حامل في الأسبوع 33: a- صورة التبول b- الغثان c- نقص حركات الجنين d- اضطرابات المهبلية	12- ما هي جرعة الـ Anti-D التي يجب أن تعطى لسيدة حامل (16 weeks) إصابة الريزوس: مياشرة بعد أن يجري لها بزل سنوي: a- 250 IU b- 500 IU c- 1000 IU d- 750 IU
13- فيما يخص الترتود الكبدى الصفراوى، كل ما يلي صحيح عدا: a- أكثر ما يشاهد في الثلث الثالث للعمل b- أفضل توليد المربية في الأسبوع 37-38 c- يتميز بحكة معصمة مع طفح حادى d- مخبرياً، يشاهد ارتفاع في الترانساميناز	14- يوصى بالعلاج المعوض بدمض الفوليت لتسببات التوالى برغبين بالحمل، تتوقفه من: a- Trisomy 21 b- السكرى الحملى gestational diabetes c- عيوب الأنبوب العصبي neural tube defects d- تحدث النمو ضمن الرحم (IUGR)
15- قطر تدخل المعجى الوجهى بتمام الاستطاف هو: a- القطر بين العنابر 9.5 cm b- القطر القوى المعجى 11.5 cm c- القطر تحت النقى الرعائوى 9.5 cm d- القطر النقى القمى 12.5 cm	16- يوضع التنظير الأولى لاختلال المشيمة المبكر عن طريق: a- التصوير بالأصوات فوق الصوتية b- القعوص المخبرية c- بزل السائل الشوي d- الصورة السريرية والقعوص القزبانى
17- ما هي النكتة الأكثر ملاءمة لتقديم طول عنق الرحم: a- CT Scan b- Ultrasound c- تقييم العريان بالنوثر Doppler flow d- الرنين المغناطيسى IRM	18- بقى اختبار Apt فى تنظير واحد مما يلي: a- العلامة الدموية bloody show b- الارتكاز المعيب placenta praevia c- الحكة المشيمة المبكر placental abruption d- الوعاء المتقدم على المعجى vasa praevia
19- يشكّل كل مما يلي اختلافاً لـ preeclampsia عدا: a- الاختلاجات b- انشقاق الأغشية المبكر c- موت محصول الحمل ضمن الرحم d- تأخر النمو ضمن الرحم	20- تتضمن انتغرات الفيزيولوجية خلال العمل واحد مما يلي: a- زيادة حجم الدم 100% b- نقص العضاب c- نقص حمض القلب 40% d- زيادة المقاومة الوعائية المحيطية 50%
21- أي من الإصابات النكتة ليس لها تأثير مفسح خلال العمل: a- Cytomegalovirus b- Rubella c- Toxoplasmosis d- Herpes simplex	22- ما هو الاضطراب الدموى أو الشعائوى الذى يشاهد في حالة ما قبل الإرجاج: a- نقص العضاب b- ارتفاع الصفحات c- نقص حمض البول d- اضطراب وظائف الكبد
23- اختبار الحمل لانتغرات الشذوذات الصغية الحينية عند سيدة بمر 42 عاماً هو: a- استئصال جيمائوى حوى بمر 16 - 18 أسبوع حملى b- قياس المنطقة الشفافة (شفافة الشفراء) بالايكوغرافى في الأسبوع 11 - 13 c- بزل سلى في الأسبوع 16 وإجراء تنميط صغى d- إيكوغرافى في الأسبوع 18 لدراسة الشوهات النوية والشكلية	24- فيما يخص قصور الدرق والعمل كل ما يلي صحيح عدا: a- يكون هدف العلاج الوصول إلى قيمة TSH أقل من 2.5mU/L خلال العمل b- بعد Levothyroxine مضاد اضطراب للإرضاع c- تزداد الحاجة من Levothyroxine خلال الحمل عند مريضات قصور الدرق المشخص قبل العمل d- يتم التحقق من العلاج بمعايرة TSH مرة في كل ثلث حملى

25- يزداد بعد الوضع، عند مريضه العمل المتعدد <u>خطرون:</u> a- التهاب الوريد الخثري b- الاختلاجات c- النزف d- التهاب باطن الرحم	26- فيما يخص تقييم الوضعية الفوقية خلال العمل: كل ما يلي صحيح عدا: a- زيادة في T4 الثاني b- زيادة في T3 الثاني c- زيادة قوس اليد d- زيادة مستويات T4 العنق و T3 العنق
27- حدوث نذرة في السائل السلوي مع فقر دم عند أحد التوائم وحيد البنية وحدثت موه سلوي مع استمرار دم عند الآخر يكون نتيجة لـ: a- انصمام العمل السري b- تشوهات خلقية عند الجنين c- السكري العملي d- تفاوتات وعائية بين ثوراني الجنينين	28- سيدة 27 عاماً، حدث لديها التشنج العضلية بعد 20 أسبوعاً، يكون لدى جنينها خطراً أعلى لحدوث: a- عيوب الأنبوب العصبي b- انصماء تشيلية مدهمة c- انشقاق شفة وشراع الفك d- نقص تصنع رنوي
29- يعتمد اختبار ورفة Nitrazine لتقييم التشنج الاغشية المبكر على خاصية السائل السلوي الاتية: a- PH السائل السلوي أعلى من PH المهبل b- PH السائل السلوي أخفض من PH المهبل c- كثافته النوعية أكثر من كثافة الماء d- كثافته النوعية أقل من كثافة الماء	30- سيدة خروسي 39 عاماً، حامل 39 أسبوعاً، حدث لديها التشنج العضلي بشكل منذ 12 ساعة ما هو الحدث الأكثر احتمالاً عند هذه السيدة معاً <u>يشير:</u> a- إنشال سلوي b- انفكك مشيمة مبكر c- مخاض علوي d- حمل مديد
31- بعد العمل في حالة حمل مديد إذا تجاوز سن العمل أسبوعاً وذلك ابتداء من اليوم الأول لآخر طمث LMP: a- 41 b- 40 c- 38 d- 42	32- شخص التهاب لدى حد بعد 10 أيام من ولادة طبيعية عند سيدة بعد 35 عاماً متحمسة على البنسلين، ما هو العلاج البديل عند هذه السيدة: a- Clindamycin b- Co-amoxiclav c- Erythromycin d- Metronidazole
33- رجعت سيدة في زيارتها الأولى، وتريد معرفة التاريخ المتوقع للولادة [EDD]، وقد كان آخر طمث [LMP] في 14 كانون الثاني، استناداً إلى قاعدة Naegel's يكون EDD في: a- 1 تشرين الأول b- 14 تشرين الأول c- 21 تشرين الأول d- 28 تشرين الأول	34- عندما يحس الباثوخ الأماني للمجن الفسي في الجهة اليسرى لحوض الحامل ويشعر بالباثوخ الخلفي (الامني) في الجهة اليمنى لحوض الحامل، يكون نوع الوضع: a- فسي أبمن معروض b- فسي أبمن معروض c- فسي على d- فسي عذري
35- ما هي خطوة التفسير الثانية عند سيدة لديها نزف خلص مع ردم فليسي، ومنقص (ثرة الامن منشلة): a- طلب تصوير طفلي معوري للبحث عن اعتداس قطع مشمية b- استقصاء الطرق التناسلية السفلية للبحث عن تمزقات c- إعطاء المبرهنين d- زيادة معدل تسريب الأوكسجنين	36- سيدة 32 عاماً، حامل للمرة الثالثة، سوايق قصيرة منذ 4 سنوات بسبب تشنج جنين في حملها الأول، سوايق ولادة مهبلية منذ سنتين، BMI = 26، ما هو أفضل عامل تنبؤ بامكانية الولادة الطبيعية بعد القيصرية عند هذه السيدة: a- BMI < 30 b- العمر أقل من 35 عاماً c- سوايق ولادة مهبلية d- قصر المسافة الزمانية بين الحملين

38- ينفصل العوض العفقي عن العوض الخلفي (a) الخط الإنتهائي (الاسم له) Linea terminalis b- الغشاء السد Obturator membrane c- الحوض العفقي Acetabulum d- الرباط العفقي الشوكي Sacrospinous ligament	37- أي من الأنسجة يجري على الشريكتين الرحميتين والعائيتين؟ a- الرباط القضي القضي العفقي Infundibulopelvic ligament b- الرباط الرحمي العفقي Utero-sacral ligament (c) الرباط العرضي Broad ligament d- الرباط الأساسي Cardinal ligament
40- يمكن أن تنجم التشوهات الخلقية الانبساطية من: التهتك. وانسداد شراغ العنق. وصغر الرأس. عن تناول العامل أحد الأدوية الانبساطية في السنة الأولى للولادة: a- Heparin b- Insulin c- مدرات البول Thiazide diuretics (d) Phenytoin	39- يمكن أن تشير التغيرات المعنوية في معدل نظم القلب الأساسي مع عودة سريعة إلى النظم الأساسي، نحوي: a- حالة حذيفة حيدة b- مخطط قلب منبسط c- زيادة الحركية القلبية المنبسطة (d) نقص السائل السلوي
42- يكون الهدف الرئيس من إعطاء حالات المضاعفات في تدبير المضاعفات الحادة هو: (a) تأخير العمل لإعطاء الكورتيكوستيروئيد b- تأمين الوقت لإجراء تدابير علاجية c- الحفاظ على العمل حتى تسلمه d- علاج الإنسداد الوعائي	41- ما هي العبارة التي تصف العمل المعنوي بين الأنسجة: a- وجود حمل نوامي هادئ b- وجود حمل هادئ خارج أنبوب فالوب c- وجود حملين هادئين في مكانين مختلفين في نفس الوقت (d) وجود متزامن لحمل ضمن الرحم وحادئ هادئ
44- نستطيع بشكل عام رؤية كيس حمل ضمن الرحم عن طريق الأبرار المهبلية ابتداء من عنه RHcg أكثر من: (a) 1000-1500 mIU/ml b- 5000-6000 mIU/ml c- 3000-4000 mIU/ml d- 200-500 mIU/ml	43- أي فحص من بين الأنسجة يجري على السائل السلوي لحساب معدل السماعة الفيزيائية الحيوية: a- معدل L/S Lecithin/sphingomyelin b- الكثافة البصرية عند الموجة 650 نانومتر c- وجود الفوسفاتيديل غليسرول (d) حجم السائل السلوي
46- عندما يعطى الادرينالين لعلاج المضاعفات البكر فانه يشهد إنتاج واحدًا مما يلي: a- Calcium b- Oxytocin (c) Prostaglandin d- Thrombin	45- يزداد حدوث انقباض الشفتين والحاجة إلى الولادة القيصرية بشكل ملحوظ عندما يكثر وزن الجنين بـ _____ غرام على الأقل: a- 3000g b- 3500g (c) 4000g d- 2500g
48- بعد اختبار التحريض السعوي إيجابياً عند حدوث: (a) تسارعات 15bpm ولمدة 15 ثانية b- تباطؤات متأخرة c- تباطؤات متغيرة d- تباطؤات مبكرة	47- يعرف المنطق الناطق المساعد في الولادة المهبلية عندما يكون رأس الجنين: a- خارج العجان (b) متخلاً بمسوى +2 c- يكون بمسوى فاع الحوض d- يكون أعلى من مسوى +2

49- تتميز سعة الشغرية الطبيعية لقلب الجنين بأنها: (a) بين 6 - 25 bpm b- موجودة ولكنها تعادل 5 bpm أو أقل c- أعلى من 25 bpm d- غير موجودة	50- يعرف بطء القلب بوجود معدل ضربات قلب أساسي أقل من: (a) 110 bpm b- 80 bpm c- 100 bpm d- 140 bpm
51- يكون الطور الثامن للمخاض منتظماً عند الولادة إذا زاد عن: a- 10 hours b- 20 hours c- 24 hours d- 14 hours	52- السبب الطبيعي الوالدي الأكثر ترففاً مع جنين عرقلي هو: a- ارتفاع الضغط b- قصور الدرق c- السكري d- الصرع
53- يمكن أن يستخدم كل مما يلي في علاج نزف المخاض عدا: a- Misoprostol b- Syntocinone c- Syntometrine d- Mifepristone	54- كل ما يشك عامل خطر لنزف المخاض عدا: (a) تعدد النمو ضمن الرحم b- عديدات الولادة c- الإنسقاء الأمنيوسي d- العمل المتعدد
55- عند أي مستوى يكون قطر الرحم عند حامل بعمر حملي يعادل 28 اسبوعاً: a- النبل الخنكري b- منتصف المسافة بين النبل الخنكري والسرّة c- منتصف المسافة بين ارتفاع العانة والنبل الخنكري d- مستوى السرّة	56- في أي عمر حملي تبدأ الخروس بالمشعر بحركات جنينها؟ a- 10 - 12 weeks b- 14 - 16 weeks c- 22 - 24 weeks d- 18 - 20 weeks
57- أي مما يلي يمثل نسبة حدوث المجن المغطى: (a) 3.5 % b- 15 % c- 95 % d- 1 %	58- أية قطعة من القيم الآتية لمشعر المسك السلبي السلبي تتوافق مع فترة سلكي سلبي: a- 15 cm b- 4 cm c- 10 cm d- 8 cm
59- من بين الآتي ما هي العبارة الأفضل لوصف ارتكاز مشيمة معيب جزئياً: a- توضع المشيمة قرب الفوهة الباطنة لعنق الرحم دون أن تلامس حافتها خافة الفوهة الباطنة b- توضع خافة المشيمة عند خافة الفوهة الباطنة لعنق الرحم c- تغطي المشيمة كامل الفوهة الباطنة لعنق الرحم d- تمت خافة المشيمة لتغطي جزءاً من الفوهة الباطنة لعنق الرحم	60- السببان الأكثر شيوعاً للنزف التماسكي في الثلث الثالث للعمل هما: a- انفكك مشيمة باكراً + وعاء متقدم على المعن b- ارتكاز مشيمة معيب + تمزق رحم c- انفكك مشيمة باكراً + ارتكاز مشيمة معيب d- تمزق رحم + وعاء متقدم على المعن

62- <u>المعرض الآخر لمرض الجنين هو:</u> a- قصر عن الصدر b- القصر بين العنق والصدر c- القصر بين العنق والصدر d- القصر تحت العنق فوق الصدر	61- <u>الأداة الأكثر فائدة لتقييم تعدد النمو ضمن الرحم</u> (HUGR) <u>هو مستندة من:</u> a- بول سائل ملوي b- قياسات وزن الحمل c- فحوصات توليدية بالأمواج فوق الصوتية d- اختبار السعة CST
64- <u>ثبوتة على الرحم التي تعرف بالعمل الجيني</u> <u>المجري في العمل الجيني هي:</u> a- Doderlein sign b- Naegle sign c- Hegar sign d- Chadwick sign	63- <u>أيهما يخص السكري والحمل كل ما يلي صحيح</u> علا: a- تنقص العنقة من الأسولين بعد الولادة b- تنقص العنقة من الأسولين في أول الحمل c- لا يعبر الأسولين المشيمة d- أكثر الحالات هي من نوع السكري المعلى
66- <u>من المختلطات السكري عند حديث الولادة ما يلي</u> علا: a- زيادة كلس الدم b- نقص سكر الدم c- فرط البيروتين d- نقص مغزبوم الدم	65- <u>الخطوة الثانية في المعنى الجيني هي:</u> a- جدر الألف b- العنقة c- الدم d- السكر
68- <u>يشير كل ما يلي مضطرب استقلابي لا عطاء</u> <u>الأستينوسين ما عدا:</u> a- المعنى المعترض b- الفروس c- منق العوض d- نغم العنق	67- <u>يمكن أن يكون لمعدلات R المستندة في علاج</u> <u>المعترض السكر الآثار العقلية الآتية ما عدا:</u> a- اعتلال السائل b- زيادة كالسيوم الدم c- اعتناء العنقة القوية d- زيادة سكر الدم
70- <u>من تأثيرات قصور الكلى على الحمل كل ما يلي</u> علا: a- الإجهاد b- ارتداد المشيمة المعبد c- اعتك المشيمة السكر d- الاستعداد المعلى	69- <u>كل ما يشغل خطر للاستعداد المعلى ما</u> علا: a- قصة عالية لعلة ما قبل إرجاع عند الأم b- لو الأخت c- عمر الحمل أكثر من 40 عاماً d- السكري أو الداء
72- <u>أي غرض تدلورام السلية هو الأكثر تشاكاً مع</u> <u>الأسطاط العظوي؟</u> a- الورم البقي ضمن العنقة الرحمية b- الورم البقي تحت المشيمة c- الورم البقي تحت المعلى d- الورم البقي المتوسع بين وريقتي الرباط	71- <u>تأثير السكري المعلى على الحمل كل ما يلي</u> صحيح علا: a- يزيد خطر العنقة العنقية b- يزيد معدل الإملاص c- يزيد التنوعات العنقية d- يزيد خطر الاستعداد المعلى

74- يكثر بعد الولادة يكون طفن الأم المشربة معرضاً لخطر زائد لحدوث: a- نقص سكر الدم b- فرط سكر الدم c- انخفاض خلوي سكري d- انخفاض حديث الولادة	73- ما هو المكان الأشيع لتنعيش الحمل خارج الرحم (الحمل الهاجر)؟ a- المبيض b- عنق الرحم c- جوف الزينون d- أنبوب فالوب
76- أي من العوامل الآتية بعد العمل الأكثر أهمية في حدوث الحمل الهاجر؟ a- استخدام التوليد IUD b- استخدام حبوب منع الحمل الودعسرونية c- أنية التوسى فالوب الانتهاية مثل PID d- استخدام معرضات الإنعنة	75- يزيد سوء المسائل التنوي عند العريضة المشربة خطر واحداً مما يلي: a- إبتان والذي تقاسي b- عدم تناسب حوضي جنيني c- انفكك مشيمة بالكر d- تشوهات الأمطراف
78- يمكن أن تستخدم الأدوية الآتية في علاج عند الرحم عان: a- Prostaglandin E2 (P E2) b- الأوكسيتوسين c- المبرحين d- Prostaglandin F2 α	77- ما هو الشئ المشترك بين ارتكاز المشيمة المعيب وانفكك المشيمة الباكر؟ a- وجود انفكك الرحمية المنتظمة b- وجود معدل ضربات قلب جنيني طبيعي c- رحم ممتلئ بالخص d- نزف مهلي
80- أكثر عامل مسبب لاختلال الطرق البولية عند الجنين هو: a- Pseudomonas b- Groupe B streptococcus c- Neisseria gonorrhea d- Esherchia Coli	79- يعرف فقر الدم خلال الحمل بهبوط قيمة الهيمتوكريت دون الـ: a- 50% b- 40% c- 20% d- 30%