

- 1 أشيع أماكن حدوث التصلب العصيدي عدا:

ـ A. الشريان الفخذي العميق

- 2. الشريان الفخذي السطحي يتآذى ضمن:

ـ A. قناة المقربات

- 3 العرج الوعائي المتقطع الإجابة الخاطئة:

ـ A. نقص التروية أثناء الحركة

- 4. من عوامل الخطر في التصلب العصيدي عدا:

ـ A. الكحولية.

- 5-في متلازمة لوريس الخطأ:

ـ A. غياب النبض المأبضي

- 6. نجأ للتصنيع الوعائي عبر الجلد في:

ـ A. الافات الموضعية الصغيرة

- 7. أفضل إجراء في الأفة الأبهيرية الحررقية السادمة:

ـ A. المجازة الأبهيرية الفخوذية ثنائية الجانب

8- أشيع مكان للصمات الكبيرة:

A . الشريان الفخذي الأصلي

- 9. فرط القابلية للتختثر تكون في:

A . الأوعية الظنوبية والقوس الخمسي.

10- خثار وعاء ذي إصابة مزمنة تكون في:

A . الشريانين الفخذية السطحية والمابضية

- 11 . في إقفار الطرف السفلي الحاد يجب إعادة التروية خلال :

. ساعات A 6

12- من استطبابات خرع الصفاق في تنادر الحجرات ، الخاطئة:

A . الضغط $20 < \text{مم زئبق}$

- 13 . نقص التروية الحاد بالطرف السفلي عدا:

A . العلاج بالوارفارين

14- في نقص التروية المساريقية الحاد، الخطأ:

A . نستخدم المجازات الصناعية بالاحتشاء.

15- تستطع المعالجة الطبية في التضيق الكلوي:

A . عسر تصنع ليفي

B . تصلب عصيدي معّد

C . كلاهما خطأ

16- يستطب استئصال بطانة الشريان السباتي فيما يلي عدا:

A . فالج معقد مع تضيق 60%.

B . TIA مع تضيق 50-99%.

C . فقد رؤية عابر مع تضيق 50-99%.

D . CVA مع تضيق 50-99%.

17- مضادات استطباب الجراحة في CVA (مفتاح) :

A . فالج معقد

B . انسداد تام للسباتي الباطن

C . وجود مرض داخلي مزمن ينقص توقعات الحياة

D . نقص تروية حاد بالطرف السفلي

18- مريض كانت عنده قمة الإنقباض بالشريان السباتي الباطن 267 وسرعة نهاية الانبساط 123 ونسبة السرعة 2.32 إِن مقدار تضيق الشريان الكلوي:

A . 15-1%.

B . 49-16%.

C . 75-50%.

D . 99-76%.

19- أم الدم الجرثومية:

كيسية A.

20- أم الدم المأبضية عدا:

التمزق شائع A.

21- من استطبابات استئصال أم الدم عدا:

نمو 2 < ملم بالسنة A.

22- الأماكن الأكثر شيوعاً للإصابة بأم الدم:

A. الأبهر تحت مستوى الشريانين الكلويين

B. الشريانين المأبضية

C. كلاهما صح

D. كلاهما خطأ.

23- علاج داء رينو الأولى عدا:

A. خزع ودي رقبي

24- داء رينو الثانوي عدا:

A. شعريات الأظافر طبيعية

25- في داء كاوازاكي:

A. الإصابة في الشرايين الكلوية والمساريقية شائعة.

26- علاج التهاب الوريد الخثري عدا:

A. الممیعات.

27- يصنف التسلخ الأبهري في بربخ الأبهر بحسب ديبكي:

.III A.

28- في علاج تسلخ الأبهر: (مفتاح)

A. تعالج. امهات دم الأبهر الصاعد نموذج a. جراحيا

B. تعالج امهات دم الأبهر الصاعد نموذج b دوائياً

C. تعالج a باستبدال الدسام البهري دوما.