

اسم الطالب:
المدة: ساعة فقط
الدرجة: ٧٠ درجة

جامعة البعث
كلية العلوم الصحية
امتحان مقرر الجراحة الصغرى

اختر الإجابة الخاطئة (إجابة وحيدة)

(١) العلامات الحيوية

- A. يدل وجودها على الحياة وعلى أن وظيفة الأجهزة الأساسية في الجسم جيدة
- B. بعد النبض مشعرا محيطيا لدقات القلب
- C. بعد النبض الخيطي من علامات الصدمة ويعبر هذا المصطلح عن ضعف النبض
- D. إن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة بعد العمل الجراحي مباشرة لا يعبر عن الالته

(٢) إعطاء الأدوية بطريق الحقن

- A. تعتبر الصدمة من مضادات الحقن العضلي
- B. لا يحقن عادة أكثر من ٥ ملم في نفس المكان بطريق تحت الجلد
- C. إن الرمز SC يعني عند وجوده على حبة أن هذا الدواء يعطى بالطريق داخل الأدمة
- D. يتم الحقن الوريدي بمحقنة مجهزة بإبرة ذات برية قصيرة

(٣) فيما يتعلق بالحرارة

- A. من المعروف أن حرارة الإنسان الفيزيولوجية غير ثابتة
- B. يجب رج الميزان قبل الاستعمال
- C. مدة قياس الحرارة الشرجية هي ثلاث دقائق
- D. أفضل بل و أنق الأماكن لقياس الحرارة هو الشرج

(٤) فيما يتعلق بالتنفس

- A. يستحسن تعداد مرات التنفس والمريض دائم
- B. يسرع التنفس بالوقوف فيزيولوجيا
- C. يسرع التنفس في الأمراض الحمية
- D. يسرع التنفس فيزيولوجيا أثناء الضغطاج والنوم

(٥) تنبيب المعدة

- A. يعتبر انسداد البواب استجابة لتنبيب المعدة
- B. عند سحب الأنبوب الأنفي المعدي يجب سده
- C. لا يمكن للأنبوب الأنفي المعدي أن يحدث انتقاليا في جدار البلعوم
- D. يمكن تنبيب المعدة عبر طريقتين تشريحيين

(٦) بزل الجنب من أجل انصباب سائل

- A. يجب تشخيص الانصباب سريريا وشعاعيا قبل البزل
- B. يجرى البزل على الخط الإبطني المتوسط وفي الورب الثالث
- C. يجرى البزل على الخط الإبطني الخلفي وفي الورب السادس
- D. يجرى البزل حذاء ذروة الكتف وفي الورب الثامن

(٧) الفحص السريري للمريض

- A. إن الأعراض هي كل ما يشكوه المريض
- B. إن العلامات هي ما يكشفه الطبيب أثناء الفحص الفيزيائي أو السريري للمريض
- C. إن المعضض (أو الإيلام) هو من الأعراض
- D. إن النفخة القلبية هي من العلامات

- ٨) بزل البطن أيضا
- A. يمكن إجراؤه لأسباب استقصائية
 - B. قد يجرى لأسباب علاجية بحثة
 - C. قد يحدث الفشي لذلك يجب افراغ الحين بسرعة عندما يجرى لتجنب ذلك
 - D. قد يختلط بالتهاب بريتوان حاد تالي لتقب أحد الأحشاء

- ٩) من العوامل المؤثرة على ترميم الجروح
- A. يعيق الضياع المادي في النسيج التندب الصحيح للجروح
 - B. قد تؤدي الأجسام الأجنبية لانتان الجرح وتشكل نواسير
 - C. تسرع الفرز العديدة المشدودة اندمال الجرح
 - D. للجراح دور مساعد فقط في شفاء الجروح

- ١٠) النزوف وإسفافاتها
- A. يختصر إسفاف النزوف بكلمة واحدة هي قطع النزيف
 - B. يتميز النزف الشعري بأنه نزف مستمر قليل الغزارة عادة
 - C. يشخص النزف الداخلي من خلال أعراضه
 - D. يعتبر ربط الوعاء النازف الطريقة الأساسية والمفضلة في الإرقاء

- ١١) القواعد واجبة التطبيق في استخراج الأجسام الأجنبية
- A. يجب عدم استخدام التخدير العام
 - B. قطع الدوران المؤقت في حالة المساعد أو الساق
 - C. استعمال التطهير الشعاعي إذا كانت ظليلة على الأشعة
 - D. عدم التردد في التوقف عن البحث في حال الفشل في إيجاد الجسم الأجنبي

- ١٢) تضميد الجروح
- A. يطبق التضميد الرطب في التهاب البربخ الحاد
 - B. يطبق التضميد بالحقن في معالجة التهاب الأوعية اللمفاوية
 - C. لا يهدف تضميد الجروح إلا إلى امتصاص المفرزات الناجمة عنها
 - D. إن خواص التبخر في الشاش شديدة جداً على عكس القطن

- ١٣) في خياطة الجروح
- A. قد تكون الخياطة بدنية
 - B. قد تكون الخياطة ثانوية
 - C. يجب تقريب شفتي الجرح بواسطة الخياطة لمنع انثائه خلال تندبه
 - D. تجرى الخياطة بعد تطهير الجرح

- ١٤) الاحتياطات الواجب إتباعها لدى إعطاء أية حقنة دوائية
- A. الانتباه الشديد إلى شروط التعقيم والتطهير
 - B. حل الفلاكونات بموائل معقمة
 - C. من المحبذ إعطاء الأدوية المراد حقنها بحقنة واحدة شريطة أن يكون ذلك عند نفس المريض
 - D. ينبغي تجنب إعطاء نفس الدواء بنفس الحقنة لأكثر من مريض

- ١٥) فيما يتعلق بالضغط الشرياني
- A. يدل الضغط الانقباضي على ضغط الدم داخل الشرايين خلال فترة إنقباض البطين الأيسر للقلب
 - B. يتعلق بقوة الإنقباض القلبي
 - C. يتعلق بمرونة الشرايين والأوعية الدموية

- ١٦) الخلع
D لا علافة له بكمية الدم الجائل
A قد يهدد الخلع العناصر الوعائية والعصبية المجاورة بالأذية
B إن لكل من التشخيص والرد المبكر للخلع أهمية كبرى في التقليل من الاختلاطات
C عادة ما يحتاج للتخدير في رد الخلع
D أما التثبيت فليس مطلقاً كما هو الحال في الكسور

- ١٧) الكسور
A تعتبر معالجة الصدمة جزء من معالجة الكسور
B من أسباب عدم التئام الكسر أن يكون المصاب به صغير السن
C قد يكون الرد المغلق مباشراً أو بعد تمديد متواصل لفترة من الزمن
D قد تجري كلا من الرد والتثبيت بطريقة جراحية في عمل جراحي واحد

- ١٨) في خياطة الجروح
A من أشكالها الخياطة ذات القطب المنفردة
B تكون عقدة الخيط فوق حافة الجرح مباشرة
C تكون عقدة الخيط غير مشدودة بشدة
D تخذل حواف الجرح بالمخدر الموضعي

- ١٩) اختلاطات البزل والتخدير النقطي
A الصداع
B ارتفاع في الضغط الشرياني بعد التخدير
C التهاب السحايا الحاد
D خدش الأعصاب

- ٢٠) أعراض نقص الحجم الدموي
A تسرع النبض
B ضعف النبض
C ارتفاع الضغط الشرياني
D الغشي

- ٢١) حول معرفة دخول الأنبوب الأنفي المعدي في السبيل الهوائي
A سماع فرقة بالشرسوف عند نفخ الأنبوب بالهواء
B ازراق المريض مع السعال الشديد
C سعال شديد عند حقن الأنبوب بقطرات من الماء
D خروج فقاعات إذا وضعت نهاية القطرة في الماء

- ٢٢) الحروق
A تتظاهر حروق الدرجة الأولى باحمرار مؤلم مع إنتاج
B تعتبر حروق الدرجة الثانية سطحية نسبياً
C تتميز حروق الدرجة الثالثة عادة بالفقاعات النموذجية للحروق
D تصاب الأدمة وملحقات الجلد في حروق الدرجة الثالثة

- ٢٣) خطورة الحروق
A كلما زاد عمق الحرق زاد خطره
B كلما زادت سعة الحرق زاد خطره
C كلما خفت درجة التئام زاد خطر الحرق
D تزيد إصابة الطرق التنفسية بالحروق من خطورة الحروق

- B. كمادات حارة على المناطق المحروقة لتسكين ألمها
C. تغطية المسكنات اللازمة بحسب تألم المريض
D. المراجعة بعد يومين لمراقبة الحالة
- ٢٥) تدبير الحروق الخطرة
- A. تغطية المناطق المحروقة بالالبسة والأغطية
B. وضع قثطرة مثالية دائمة
C. المعالجة الجراحية المبكرة
D. تمنيع المريض ضد الكزاز

اختر الإجابة الملائمة (إجابة وحيدة)

- ٢٦) بجرى اختبار التحسس الجلدي بطريق الحقن :
- A. الوريدي
B. العضلي
C. تحت الجلد
D. داخل الأدمة

٢٧) تستعمل طريقة الحقن تحت الجلد :

- A. لحقن الإنسولين عند السكريين
B. لحقن الكورتيزون عند البدينين
C. لإجراء اختبار التحسس
D. لإجراء اختبار السلين

٢٨) في الحقن الوريدية يفضل تجنب الحقن في

- A. الوريد الوداجي
B. الوريد الرأسي والغاعدي في ثنية المرفق
C. أوردة الساعد
D. أوردة ظهر اليد

٢٩) مضادات استطباب الحقن العضلية

- A. وجود ضمور عضلي
B. في حالة الميل للنزف
C. الأطفال دون السنتين
D. وجود إنتان جلدي في مكان الحقن

٣٠) إن حدوث الآلم والوذمة مكان الحقن الوريدي أثناء الحقن يدل على

- A. خزع جدار الوريد وتسرب المادة الدوائية خارجه
B. التحسس للمادة الدوائية
C. إنتان موضع
D. نزف موضع

٣١) أي السوائل التالية مفرط التوتر

- A. محلول كلور الصوديوم ٠.٩ %
B. سيروم سكري ١٠ %
C. محلول بيكرينات الصوديوم ١٤ %
D. بعض مستحلبات الدم

٣٢) عند إستخراج جسم أجنبي

- A. سأل المريض أو ذويّه عن كيفية دخول الجسم الأجنبي ونوعه
B. يجرى الشق بعيداً عنه
C. صورة شعاعية إذا كان ظليلاً على الأشعة
D. استخدام التخدير الناحي أحياناً

(٣٢) عند العصبيين والبدنيين

- A يرتفع الضغط الشرياني الانقباضي فقط
- B يرتفع الضغط الشرياني الانقباضي فقط
- C يرتفع الانقباضي والانبساطي
- D يهبط الضغط الانقباضي

(٣٤) بغية افراغ المعدة وغسلها (تسمم، تخمة حادة) يجرى مايلي

- A تنبيب المعدة بأنبوب ثخين عن طريق الفم
- B بأنبوب رفيع عن طريق الأنف
- C تغيم المعدة
- D إدخال قنطرة بيلتون للمعدة

(٣٥) لمنع حصول الغثيان والإقياء عند تنبيب المعدة يستحسن :

- A حقن كزيلوكانين في البلعوم بإبرة طويلة
- B تخدير البلعوم بإبراز كزيلوكانين
- C تخدير عام
- D تخدير ناحي

(٣٦) أهم استعمال للحقن الشرجية الزيتية:

- A في معالجة الإمساك الشديد خاصة عند المسنين
- B لتغذية المرضى
- C لمعالجة التهاب الكولون القرصي
- D في عواقب العمل الجراحي

(٣٧) لا يجوز إجراء الحقن المهبلية لدى امرأة

- A نساء (حديثة الولادة)
- B مصابة بالتهاب مهبل وعنق رحم
- C مصابة بالتهابات حوضية لا سيما الحقن الدافئة
- D كل ما سبق خطأ

(٣٨) المحاقن البلاستيكية تأتي حالياً مغلفة ومعقمة

- A بالغاز
- B بأشعة إكس (X)
- C بالأشعة فوق البنفسجية
- D بأشعة غاما

(٣٩) التعقيم هو

- A القضاء على الجراثيم
- B إيقاف نمو الجراثيم
- C القضاء على الفطور
- D اتلاف كل ذي حياة

(٤٠) يستعمل الكحول (الغول الإيثيلي) للتطهير غالباً بنسبة

- A ٧٠%
- B ٨٠%
- C ٩٠%
- D ١٠٠%

(٤١) أهم استعمال للمناشير المرققة

- A لمسك إبرة الخياطة
- B لمسك حافة الجرح عند خياطته
- C لالتقاط الأوعية الصغيرة النازفة
- D لربط الخيط

(٤٢) خيوط الحمشة

- A. غير قابلة للإمتصاص
B. قابلة للإمتصاص
C. تصنع من الحرير الطبيعي
D. تستعمل لخيطة الشرايين الكبيرة
- ١٣) أهم استعمال للقنطرة الوريدية هو
A. لسحب الدم
B. لحقن الأدوية في الوريد
C. لنزول المثانة عند الأطفال
D. عند الحاجة لإبقاء الوريد مفتوحاً لإعطاء الأدوية والميرومات لعدة أيام
- ١٤) تنضير الجروح هو
A. إستئصال الأقسام الممتونة والمتهتكة من الجرح
B. خياطة تجميلية للجرح
C. تقريب حواف الجرح بغرز معدنية
D. وضع مفجر في الجرح
- ١٥) يطلق الجرح بالخياطة إغلاقاً أولياً
A. إذا كان قاطعاً ونظيفاً
B. منتظم الحواف
C. لم يمس على حذونه أكثر من ٦ - ٨ ساعات
D. كل ماسبق صحيح
- ١٦) من أنواع الخياطات الجراحية كل مما يلي عدا:
A. الشلالية
B. بشكل حرف U
C. داخل الأنمة
D. تحت الأنمة
- ١٧) يهدد النزف الغزير والحاد حياة المريض بالية:
A. نقص حجم الدم الجائل في السرير الوعائي
B. نقص الكريات الحمر وبالتالي نقص أكسجة الأنسجة
C. كل ماسبق صحيح
D. كل ماسبق خطأ
- ١٨) تحوي وحدة نقل الدم :
A. ٢٥٠ مل من الدم
B. ٤٥٠ مل من الدم
C. ٧٥٠ مل من الدم
D. ٩٥٠ مل من الدم
- ١٩) تحفظ وحدات الدم :
A. في درجة حرارة الغرفة
B. في درجة ٤ مئوية
C. في درجة ٢٠
D. في درجة ٣٧
- ٢٠) عند إسعاف المصاب بالكسر يوصى بعدم تحريك بؤرة الكسر خوفاً من إحداث تبدل في الكسر يؤدي إلى :
A. تمزق شرياني
B. تمزق عصبي
C. صعوبة في رد الكسر
D. كل ماسبق صحيح
- ٢١) من أجهزة التثبيت المؤقتة لكسور الطرف العلوي كل مما يلي عدا
A. الميازيب المعدنية
B. الجبائر الجبسية
C. جبيرة توماس
D. الجبائر البلاستيكية
- ٢٢) لدى تثبيت الكسر يجب أن يشمل التثبيت :

- A. مكان الكسر
B. الكسر مع المفصل فوقه
C. الكسر مع مفصل تحته
D. الكسر مع المفصلين فوقه و تحته
- ٥٣) النزف الشرياني
A. يكون الدم الخارج بلون أحمر فاتح
B. يخرج الدم على شكل دفعات متوافتة مع دقات القلب
C. غزارته تختلف بحسب الشريان المصاب وبعده عن القلب
D. كل ما سبق صحيح
- ٥٤) التثبيت في معالجة الخلع :
A. ليس مطلقاً كما في الكسور
B. أن يكون لفترة قصيرة ما أمكن
C. لايسمح فيه بحركات التباعد قبل ١٠ - ١٤ يوماً
D. كل ما سبق صحيح
- ٥٥) تكون المعالجة الفيزيائية لإعادة تأهيل المفصل المخلوع بإجراء الحركات :
A. الفاعطة
B. المنفعلة
C. كلاهما
D. كل ما سبق خطأ
- ٥٦) خلع الفك السفلي الأمامي :
A. أكثر أنواع خلوع الفك السفلي حدوثاً
B. غالباً بسبب فتح زائد للغم كالتأليب
C. لايمكن إغلاق الغم في شكله تنامي الجنب
D. علاجه جراحي دائماً
- ٥٧) إن فقد الحصن لدى وخز المنطقة المحروقة بآبرة دليل على أن الحرق قد تناول
A. جميع الطبقات
B. البشرة فقط
C. البشرة والأدمة
D. تحت الأدمة
- ٥٨) تصنف الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة بأنها خطيرة إذا زادت مساحتها عن
A. (١٠ %)
B. (٢٠ %)
C. (٤٠ %)
D. (٦٠ %)
- ٥٩) كل ما يلي من اختلاطات الحروق عدا
A. الصدمة
B. القصور الكلوي
C. احمرار الدم
D. الإنسان
- ٦٠) لتضميد الحرق يفضل ان يوضع أولاً :
A. شاش مشبع بالمراهم المطهرة
B. شاش مشبع بالفازلين
C. مراهم مطهرة ثم الشاش
D. فازلين ثم الشاش
- ٦١) نوضع للمحروق قنطرة مثانية من نوع
A. فولبي
B. نيلا تون
C. نيمان
D. فوشر
- ٦٢) قبل البزل الاستقصائي يجب تحري علامة :

- A. التنبه
B. التحوصل
C. التمزج
D. التكور

٦٣ يجب تجنب حل الفوارير الزجاجية (الفلاكونات) التي تحوي مسحوقاً دوائياً :

- A. بالماء المقطر
B. بالسيروم الفيزيولوجي
C. بمخدر موضعي ١%
D. بمحلول دواء آخر

٦٤ من الأماكن المفضلة لإعطاء الحقن العضلية عند البالغين :

- A. عضلات الربع العلوي الوحشي للإلية
B. عضلات الفخذ
C. كل ما سبق صحيح
D. عضلات الربع العلوي الأسوي للإلية

٦٥ مكان بزل الجنب في الإصصاب السائل (نقطة الدخول):

- A. فوق الحافة الضلعية مباشرة
B. في الزاوية بين الغضاريف الضلعية والذيل الخنجري
C. تحت الحافة الضلعية مباشرة
D. كل ما سبق خطأ

٦٦ من أنواع التفجير كل مما يلي عدا

- A. التفجير الجراحي
B. تفجير الجروح
C. القطرة القلبية
D. القطرة الدولية

٦٧ بوضع المريض المصاب بريح صدرية لإجراء البزل:

- A. بوضعية نصف الجلوس
B. جالماً
C. مستلقياً
D. مضجعاً على جنبه المقابل

٦٨ أفضل طريقة لتثبيت القطرة الدائمة بعد دخولها للمثانة

- A. باللاصق الطبي
B. بغرزة بخيط غير قابل للإمتصاص
C. بإملاء البالون بالسيروم الفيزيولوجي
D. بغرزة بخيط قابل للإمتصاص

٦٩ نقل الدم

- A. من استطبابة الإصابة بفاقات الدم المزممة
B. من استطبابة بعض حالات الحروق
C. من استطبابة فاقات الدم التحليلية
D. من مضادات استطبابة الإنسمام بأول أوكسيد الكربون

٧٠ اختلاطات نقل الدم

- A. توقف القلب
B. نقص الميترات
C. الارتكاس الحموي
D. التهاب الوريد الخثري