

الجمهورية العربية السورية

جامعة طرطوس

كلية الطب

امتحان مقرر الأذنية لطلاب السنة الرابعة العام الدراسي ٢٠١٧-٢٠١٨، الفصل الأول

٢- بفادر عصب حبل الطبل الاذن الوسطى غير: A- الجدار الانسي B- الجدار الوحشي C- الجدار الامامي D- الجدار الخلفي E- الجدار السفلي	١- تحتوي الاذن الوسطى كل ما يلي عدا : A- عظيمات السمع B- عصب حبل الطبل C- العضلة موثرة غشاء الطبل D- عضلة الركابة E- الخلايا المهدبة الخارجية
٤- تقوم الاذن الخارجية بتضخيم الصوت حوالي عشرة ديسبل على التواترات A- ٥٠٠-2000 هرتز B- ٢٠٠٠-٥٠٠٠ هرتز C- ٥٠٠-٦٠٠ هرتز D- 600-8000 هرتز E- ٨٠٠٠-١٠٠٠٠ هرتز	٣- تنظم الخلايا المهدبة الخارجية في عضو كورتني في: A- صف واحد من الخلايا B- صفين من الخلايا C- ثلاث صفوف من الخلايا D- اربع صفوف من الخلايا E- خمس صفوف من الخلايا
٦- ان منطقة الاهتزاز الاعظمي في الحلزون تحدد حسب: A- تواتر الصوت B- شدة الصوت C- بعد المصدر الصوتي D- وضعية الراس في الفراغ E- سلامة نقيير اوستاش	٥- تقوم الاذن الوسطى بحماية الاذن الداخلية من الاصوات عالية الشدة عن طريق: A- تقلص عضلة الركابة B- تقلص عضلة المطرقة C- تقلص عضلة الركابة والمطرقة معا D- اغلاق نقيير اوستاش E- فتح نقيير اوستاش
٨- افضل اختبار بالرنانات لتقييم حالة العظيمات السمعية وحركتها هو : A- اختبار ريذيه B- اختبار ويبر C- اختبار شتاباخ D- اختبار جيليه	٧- اختبار ريذيه يسمح لنا بـ A- المقارنة بين الطريق الهوائي والعظمي للاذن B- المقارنة بين سمع المريض وسمع الطبيب C- المقارنة بين الطريقين العضروفي والعظمي D- المقارنة بين الطريقين العضروفي والهوائي
١٠- في تخطيط السمع الكلامي عتبة فهم الكلام هي الشدة التي يفهم عندها المريض: A- ٢٠% من الكلام المعطى له B- ٣٠% من الكلام المعطى له C- ٤٠% من الكلام المعطى له D- ٥٠% من الكلام المعطى له	٩- عند اجراء تخطيط السمع الكهربائي لمريض لديه نقص سمع حسي عصبي يكون: A- كلا الطريقين العظمي والهوائي منخفضان B- الطريق العظمي منخفض والهوائي طبيعي C- الطريق الهوائي منخفض والعظمي طبيعي D- كلا الطريقين ضمن الطبيعي

١١- في اختبار المعاوقة السمعية الحصول على مخطط طيلة مسطح يدل على : A- انسداد نفير أوستاش B- توسع في الأفتية نصف الدائرية C- انصباب سائل خلف غشاء الطبل D- سدادة صملاخية	١٢- في تخطيط جذع الدماغ السمعي عند مريض لديه ورم في العصب السمعي فإننا نجد : A- غياب الموجة الأولى B- غياب الموجة الثالثة C- غياب الموجة الخامسة D- تطاول زمن الكمون بين الموجة الأولى والخامسة
١٣- البث الصوتي الأذني هو انعكاس لوظيفة : A- الخلية المهدبة الداخلية B- الخلية المهدبة الخارجية C- وظيفة العظيومات السمعية D- وظيفة غشاء الطبل	١٤- عند اجراء اختبار رومبيرغ لمريض لديه اصابة محيطية فإنه : A- يبقى ثابتا B- يترنح باتجاهات مختلفة C- يترنح نحو جهة الاصابة D- يقف عن الوعي
١٥- افضل وسيلة تشخيصية لتقييم حالة الحنزون هي : MRI-A CT-B C- تصوير بسيط D- ايكو	١٦- في دمل مجرى السمع الظاهر الجراثيم المسببة هي : A- المكورات العنقودية B- المكورات العقدية C- عصيات القيق الأزرق D- السالمونيلا
١٧- الاجرية الشعيرية في مجرى السمع الظاهر تتواجد في : A- ثلثيه العظميان B- ثلثيه الغضروفي C- كامل مجرى السمع D- مجرى السمع والصيوان	١٨- في التهاب الأذن الخارجية النخري الفهيت الجراثيم المسببة هي : A- المكورات العنقودية B- المكورات العقدية C- عصيات القيق الأزرق D- ايشيرشيا كولي
١٩- في التهاب الأذن الخارجية الفطري العرض الأهم : A- الألم B- الحكه C- نقص السمع D- دوخة	٢٠- الأجسام الاجنبية في مجرى السمع تعالج ب : A- استخدام الصادات الحيوية B- استخدام القطرات الانتية C- تقطير الزيت ثم غسل الأذن D- استخدام المسكنات فقط
٢١- الانتقاب المشرشر في غشاء الطبل هو حالة : A- التهابية B- رضية C- ورمية D- تحسسية	٢٢- مريض لديه التهاب طيلة فقاعي يترافق بالم شديد ينصح ب : A- خزع غشاء طبل اسعافي B- ثقب الفقاعة بابر معقمة C- اعطاء الكورتيزون D- غسل الأذن
٢٣- التهاب اذن وسطي مصلي وحيد الجانب عند كهل السبب الأكثر شيوعا : A- ضخامة ناميات B- التهاب الف تحسسي C- التهاب الف وعائي حركي D- سرطان بلعوم انفي	٢٤- السبب الأكثر شيوعا لالتهاب الأذن الوسطى المصلي عند الاطفال : A- ضخامة ناميات B- التهاب اللوزات المتكرر C- التهاب الانفا التحسسي D- سرطان البلعوم الانفي

٢٥- في التهاب الاذن الوسطى القيحي الحاد يعتبر استئطاب اسعافي لخزغ غشاء الطبل: A-ارتفاع الحرارة B-النوار C-الطنين D- شلل عصب وجهي	٢٦- التهاب اذن وسطى قيحي حاد في الطور الثاني يكون غشاء الطبل: A-محمر ومعتق B-مصفّر C-منتقّب D- كامد ومنتجج
٢٧- في التهاب الاذن الوسطى القيحي المزمن السليم لدينا: A-ثقب مركزي في غشاء الطبل B-ثقب هامشي C-ثقب في كامل غشاء الطبل D- لا يوجد ثقب	٢٨- العلاج الاهم في التهاب الاذن الوسطى المزمن مع ورم كولسترولي: A-دوائي B-جراحي C-شعاعي D- كيميائي
٢٩- مريضة شابة لديها نقص سمع توصيلي مع غشاء طبل طبيعي التشخيص الاكثر احتمالا: A-التهاب اذن وسطى مصلي B-التهاب اذن وسطى مزمن C-التهاب اذن وسطى سلي D- تصلب ركابي	٣٠- تلجم اعراض داء منيير عن: A-زيادة توتر اللمف الظاهر B-زيادة توتر اللمف الباطن C-ارتفاع ضغط الدم D- ارتفاع الكوليسترول
٣١- في ورم العصب السمعي يحدث: A- نقص سمع استقبالي على التواترات العالية. B- نقص سمع توصيلي على التواترات العالية. C- نقص سمع استقبالي على التواترات المنخفضة. D- نقص سمع توصيلي على التواترات المنخفضة.	٣١- النكاف بسبب: A-نقص سمع استقبالي في اذن واحدة B-نقص سمع استقبالي في الاذنين C-نقص سمع مختلط في اذن واحدة D- نقص سمع مختلط في الاذنين
٣٣- في نقص السمع الفجائي العلاج الاساسي: A-اعطاء كميات كبيرة من الصادات الحوية B-اعطاء كميات كبيرة من الكورتيزون C-اعطاء خافضات الضغط الشرياني D- اعطاء المدرات البولية	٣٤- شلل عصب وجهي ايسر مع امكانية فتح واغلاق العين اليسرى: A-الاصابة ضمن قناة فالوب B-الاصابة ضمن النكفة C-الاصابة مركزية D-الاصابة بعد عصب عضلة الركابة
٣٥- مريض لديه نقص سمع حسي عصبي متوسط الشدة التدبير: A-علاج دوائي B-علاج جراحي C-سماعات سمعية D-لا يوجد تدبير	٣٦- أفضل وسيلة لاستقصاء الجيوب الانفية: A-صورة بسيطة بوضعية كالدويل B-صورة بسيطة جانبية C-صورة بالرنين D-تصوير طبقي محوري

٣٨- مريض يعاني من حرارة وصداع وسيلان النقي من الصمغ المتوسط والم في الوتيرتي احتمال التشخيص: A- التهاب جيب جبهي حاد B- التهاب جيب فكّي حاد C- التهاب النك دواني D- ورم دموي في الوتيرة	٣٧- طفل يعاني من سيلان النقي وحيد الجانب كرية الرائحة التشخيص: A- ضخامة ناميات B- التهاب جيوب مزمن C- جوليبي النقي D- جسم اجنبي في الانف
٤٠- مريض بعد قلع احد الاسنان حدث لديه سيلان قيحي من الانف ومن مكان السن التشخيص: A- التهاب جيوب حاد B- كيسة في الجيب الفكّي C- ناسور قمي غاري D- خراج في اللثة	٣٩- تتفتح القناة الدمعية على A- الصمغ العلوي B- الصمغ المتوسط C- الصمغ السفلي D- سقف الانف
٤٢- ماهو الخطأ بالنسبة للجيب الفكّي: A- قاعه اخفض من قاع الانف عند البلوغ B- جداره الانسي يجاور الانف C- جداره العلوي يجاور الحجاج D- جداره الخلفي يجاور الجيب الوتيري	٤١- المخاطية الشمية تتوضع في: A- الثلث العلوي لجوف الانف B- الثلث المتوسط C- الثلث السفلي D- كامل جوف الانف
٤٤- بالنسبة للورم اللبي النازف عند البلوغ: A- سليم سريريا B- خبيث نسجيا C- شخص بالخزعة D- علاجه جراحي	٤٢- الرعاف عند الاطفال غالبا يكون من: A- الوتيرة الانفية B- القرين المتوسط C- القرين السفلي D- الجيب الفكّي
٤٦- رعاف عند مريض مسن اهم اجراء: A- وضع دكة النفية B- اجراء كي بنترات الفضة C- اجراء كي كهربائي D- قياس ضغط الدم	٤٥- ليس من امراض الوتيرة الانفية: A- الورم الدموي B- الخراج C- الدمل D- الانتفاخ
٤٨- تتشكل الضفيرة على حساب: A- الغدة الفكفية B- الغدة تحت اللسان C- الغدة تحت الفك D- الغدة الدمعية	٤٧- بعد الجيب الكمثري جزءا من: A- البلعوم الانفي B- البلعوم القموي C- البلعوم الحنجري D- الحنجرة
٥٠- الحصيات اللعابية اكثر مشاهدة في: A- الغدة تحت الفك B- الغدة الفكفية C- الغدة تحت اللسان D- الغدة اللعابية في باطن الخد	٤٩- في تناثر جو غرين التشخيص يكون ب: A- تصوير طبقي محوري B- رنين مغناطيسي C- خزعة من باطن الشفة D- ايكو غرافي

٥١- بالنسبة للدرق المسانية الاجراء الاول : A- استئصالها بالكامل B- التفريس الومضاني للدرق C- تصوير طبقي محوري D- معالجة دوائية	52- الخطأ في انتان وحيدات النوى : A- حالة خاصة من التهاب البلعوم B- تنقل بالعدوى المباشرة C- سببه فيروس EPSTEIN BARRE D- يعالج بالامبيسلين
٥٣- في التهاب اللوزات القبيح الحاد العلاج الاساسي: A- خافضات الحرارة عن طريق الوريد B- الصادات الحيوية C- الكورتيزون D- مضادات الازمة	٥٤- مفرزات الغدة النكفية : A- مخاطية B- مصلية C- مختلطة D- كلسية
55- في ما يخص العنث الحنجري: A- ينتج عن تسمك لسان المزمار B- يصيب المنطقة فوق المزمار C- ينتج عن بقاء غشاء بين الحبلين الصوتيين في قسمها الامامي D- يصيب المنطقة تحت المزمار	٥٦- معلمة تشكو من بحة صوت مزمنة وهي غير مدخنة بتظير الحنجرة سوف نجد غالبا: A- كارسينوما حبل صوتي B- شلل حبلين صوتيين بوضع التقريب C- عنث حنجري D- عقيدات صوتية
٥٧- العلامة الشعاعية التي تدعى علامة الابهام تميز: A- التهاب لسان المزمار الحاد B- التهاب حنجرة حاد C- قيلة حنجرية خارجية D- بوليب حنجري	58- في ورم المزمار: A- الانذار سيء B- الانذار جيد C- الاعراض متاخرة D- النقائل سريعة
٥٩- في حال استنشاق جسم اجنبي العلاج المناسب A- اعطاء الصادات الحيوية فقط B- اعطاء الكورتيزون C- فتح الصدر D- تنظير القصبات	٦٠- كل ما يلي من اختلاطات تنظير المري ما عدا: A- انثقاب المري B- ريج صدرية C- ناسور رغامي مري D- شلل حبل صوتي
٦١- في تكلن الحنجرة العلاج يكون غالبا: A- دوائي B- جراحي C- الشفاء عفوي D- شعاعي	٦٢- بالنسبة لبوليب الحبل الصوتي كل مايلي صحيح ما عدا: A- اشيع عند الرجال B- عبارة عن استحالة وزمية في الحبل الصوتي C- يتوضع عند نقطة التقاء الثلث الامامي مع الثلثين الخلفيين D- لا يسبب بحة صوت
٦٣- الاجسام الاجنبية المستنشقة تشاهد اكثر في: A- القصبة اليسرى B- القصبة اليمنى C- الرغامى D- الحنجرة	٦٤- في خزع الرغامى الاسعافي يجري الشق في: A- الغشاء الحلقى الدرقي B- الغشاء الدرقي اللامي C- الحلققتين الرغاميتين الاولى والثانية D- الحلققتين الرغاميتين الثانية والثالثة

