

جامعة طرطوس-كلية الطب البشري-2017-2018
الأمراض الخمجية سنة رابعة-فصل ثاني-(خمسون سؤال)

- اختر لكل مما يلي ما يناسبه من الخيارات (يمكن للخيار أن يتكرر):
- 16- الآفة البنية قد تحدث خارج الأعضاء التناسلية
- 17- تفرح على الأعضاء التناسلية الظاهرة مع ضخامة عقد لمفاوية مؤلمة
- 18- قد تحدث إصابات معممة دون أن تترافق مع أعراض إصابة تناسلية
- 19- أكثر أسباب القرحات التناسلية شيوعاً
- 20- من أسباب التهاب غدة بارتنولان وحيدة الجانب
- A- السيلان البيني
- B- الإصابة بفيروس الورم الحليمي الإنساني HPV
- C- العقبول التناسلي
- D- الداء الزهري syphilis
- E- الداء المغي الحبيبي المغني lymphogranuloma inguinale
- 21- قد تترافق الصدمة الإنتانية بما يلي عدا
- A- انخفاض الحرارة
- B- انخفاض تركيز عامل النخر الورمي TNFα في المصل
- C- نقص العدلات
- D- متلازمة القصور التنفسي الحاد ARDS
- E- ارتفاع الحرارة
- 22- في التهاب السحايا الفيروسي كل ما يلي صحيح ماعدا
- A- غالبية الإصابات تشاهد لدى الأطفال والبالغين
- B- البدء مفاجئ
- C- وجود المعتدلات neutrophils بكثرة في س.د.ش في بداية الإصابة
- D- البروتين طبيعي أو مرتفع قليلاً في س.د.ش
- E- الإنذار سيئ ونسبة الوفيات عالية
- 23- كل ما يلي عن التهاب السحايا بالمكورات السحائية صحيح ماعدا
- A- يفيد معايرة جزيئات المحفظة LPSs في الدم و س.د.ش في تحديد الإنذار
- B- المجموعة المصلية A تسبب الجائحات الكبيرة
- C- زيادة نسبة الحملة الطبيعيين ينذر بحدوث جائحة
- D- يمكن أن تسبب إنتاناً "صاعقاً" يؤدي للوفاة السريعة
- E- العلاج النوعي لها فانكومايسين vancomycin
- 24- كل ما يلي صحيح ماعدا
- A- انخفاض تركيز السكر في س.د.ش. يرجح التهاب السحايا القححي
- B- تزداد نفوذية الصادات إلى س.د.ش بإعطاء الستيروئيدات القشرية
- C- يكون البروتين مرتفعاً في س.د.ش. في التهاب السحايا الفطري
- D- الوقاية من المكورات الرئوية والسحائيات لدى التعرض للعدوى ريفامبيسين 10ملغ/كغ مرتين يومياً لمدة يومين
- E- تكون نسبة للمفاويات مرتفعة في التهاب السحايا المجهض
- 25- عند وجود حمى مع اعتلال عقد لمفاوية معم تفيد الاختبارات التالية عدا
- A- تفاعل البقعة الوحيدة monospot
- B- تفاعل التراص للسامونيلا التيفية (Widal)
- C- تحري أضداد البروسيل من نوع IgG
- D- تحري أضداد التوكسوبلازما من نوع IgM
- E- تحري أضداد فيروس HIV بطريقة ELISA

- اختر لكل مما يلي ما يناسبه من الخيارات (يمكن للخيار أن يتكرر)
- 1- تسبب جائحات لدى الولدان
- 2- ضخامة عقد مساريقية
- 3- تنتقل عن طريق الأبقار ومنتجاتها
- 4- فترة الحضانة 1-6 ساعات
- 5- تحدث الإصابات بشكل إفرادي لدى معظم الأطفال تحت عمر سنتين
- 6- المتلازمة اليوريميائية الانحلالية hemoletic uremic syndrome
- 7- تحدث الإصابات في فصل الشتاء خاصة
- A- العصيات الكولونية الممرضة للأععاء E.P.E.C.
- B- اليرسينيا المعوية yersenia enterocolitica
- C- التسمم الغذائي بالعنقوديات الذهبية
- D- العصيات الكولونية النزفية EHEC
- E- فيروس الروتا Rota virus
- 8- كل ما يلي عن التهاب الكبد الفيروسي HAV صحيح ماعدا
- A- الإصابات الشديدة تشاهد خاصة عند الكبار
- B- يشخص بتحري الأضداد النوعية IgM
- C- يقل طرح الفيروس في البراز بعد ظهور اليرقان
- D- الحماية غير ضرورية في العلاج
- E- لا يوجد له لقاح فعال
- 9- كل ما يلي عن التهاب الكبد-B صحيح ما عدا
- A- تشفى 90% من الإصابات الحادة تلقائياً بدون علاج
- B- وجود الأضداد للبيئة الكلية antiHBc-total بعد 6 أشهر من الإصابة يدل على إصابة مزمنة فعالة
- C- أضداد المستضد السطحي HBsAb لا تظهر قبل الشفاء التام
- D- ظهور الضد اليائي HBeAb في الإصابة المزمنة يدل على حدوث الاندخال integration
- E- الإصابة المزمنة لا تشفى بدون علاج
- اختر لكل مما يلي ما يوافق من الخيارات (يمكن للخيار أن يتكرر)
- 10- اللايشمانيا الحشوية visceral leishmaniasis
- 11- داء المقوسات toxoplasmosis
- 12- داء البروسيل الحادة brucellosis
- 13- الحمى المعوية (تيفية) enteric fever
- 14- داء لايم Lyme disease
- A- نسبة النكس والحمل أقل لدى المعالجين بالكينولونات
- B- فترة العلاج الموصى بها هي 6 أسابيع
- C- إصابة الجملة العصبية المركزية من المشاكل الشائعة عند ناقصي المناعة
- D- المستودع الرئيسي له الغزلان والفئران ببيضاء القدم
- E- أسهل وسيلة للتشخيص بزل الطحال
- 15- في الإصابة بفيروس عوز المناعة المكتسب HIV ما يلي صحيح عدا
- A- ينتقل بالرضاعة الطبيعية
- B- تتأثر المناعة الخلوية أكثر من الخلطية في سير المرض
- C- سلبية الاختبارات المصلية النوعية كال ELISA تنفي التشخيص
- D- يمكن أن يشاهد زيادة نسبية في تعداد للمفاويات في المرحلة الأولى
- E- يمكن أن تبقى الإصابة لاعتراضية لأكثر من 20 سنة

- اختر لكل مما يلي ما يناسبه من الخيارات (يمكن للخيار أن يتكرر)
- 26- المستودع الرئيسي الحيوانات الرعوية الأهلية والبرية
- 27- المستودع الرئيسي الطيور البرية
- 28- اعتلال شبكية مع ضياع رؤية
- 29- إقياء مع آلام بطنية وإسهال مدمى
- 30- طفح حطاطي حمامي مع اعتلال عقد بلغمية
- 31- يوجد لقاح فعال هو D-17

- A- الحمى الصفراء yellow fever
- B- حمى الوادي المتصدع Rift Valley fever
- C- حمى غرب النيل West Nile fever
- D- الحمى النزفية الإفريقية

32- في النزلة الوافدة influenza ما يلي صحيح عدا

- A- معظم الوفيات تشاهد لدى الأطفال
- B- فترة حضانتها 1-3 أيام
- C- الأوبئة الشاملة تحدث بسبب تغيرات جينية تصيب الفيروس
- D- لا ينفذ الأمانتادين في علاج الإنفلونزا-B
- E- يحظر استخدام الساليسيلات في المعالجة العرضية لدى الأطفال خوفاً من حدوث متلازمة راي Rey's

33- كل ما يلي عن الإصابة بالكوليرا خطأ ما عدا

- A- معظم الإصابات تحت سريرية
- B- العدوى من شخص لآخر شائعة
- C- تفرز زيفان يؤدي لحدوث نخر في الغشاء المخاطي للأمعاء
- D- الصادات المناسبة تقصر أمد الإصابة
- E- تكرر الإصابة وارد بسبب ضعف المناعة المتشكلة

اختر لكل مما يلي ما يناسبه من الخيارات (يمكن للخيار أن يتكرر)

- 34- معظم الإصابات تشاهد لدى المزارعين وعمال المجاري
- 35- الآلية المرضية بحدوث اعتلال أو عية منتشر vasculitis
- 36- يحدث طفح حطاطي حمامي حاك عند إعطاء البنسلينات غالباً
- 37- من الاختلالات تمزق الطحال العفوي
- 38- تحدث زيادة واضحة في الغلوبولين مع نقص في الألبومين
- 39- الآفة النسجية المميزة للإصابة هي الأورام الحبيبية granulomas

- A- داء البروسيلة brucellosis
- B- داء وحيدات النوى الخمجي infectious mononucleosis
- C- داء البريميات leptospirosis
- D- حمى الوادي المتصدع Rift Valley fever
- E- اللاشمانيا الحشوية visceral leishmaniasis

40- في الصدمة الإنتانية كل ما يلي صحيح ما عدا

- A- انخفاض الحرارة يعني إنذاراً أسوأ للمريض
- B- يشاهد تطاول واضح في زمن البروثرومبين
- C- إعطاء رافعات الضغط من أهم الخطوات في التدبير
- D- من المظاهر الخطيرة متلازمة القصور التنفسي الحاد ARDS
- E- فرط التهوية تشاهد في المراحل المتأخرة

41- ضخامة العقد البلغمية. المعممة تشاهد في كل ما يلي عدا

- A- داء البروسيلة
- B- الملاريا
- C- الطور الحاد للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب
- D- داء وحيدات النوى الإنتاني
- E- حمى النيل الغربي West Nile fever

42- تتصف الإصابة بداء البروسيلة brucellosis بما يلي عدا

- A- قد تحدث العدوى بدخول الجراثيم عبر الجلد غير السليم
- B- معظم الإصابات تحت سريرية ولا تحتاج للعلاج
- C- يجب عزل المريض خلال المرحلة الحادة لمنع العدوى للغير
- D- نتيجة زرع الدم النظامي فيها تحتاج إلى 6 أسابيع
- E- مدة العلاج يجب أن لا تقل عن 6 أسابيع

43- في اللاشمانيا الحشوية الفعالة كل ما يلي صحيح عدا

- A- الإصابات تترافق مع تثبيط في إنتاج الخلايا Th-1
- B- تحدث ضخامة مترقية في الكبد والطحال غير مؤلمة بالجلد
- C- يشاهد نقص واضح في الغلوبولينات المناعية
- D- اختبار اللاشمانين الجلدي Montenegro's سلبي
- E- التشخيص بكشف الطفيلي بعينات مأخوذة من الطحال أو نقي العظم أو النسيج اللمفاوي

44- في الإصابة الحادة بفيروس HIV كل ما يلي صحيح عدا

- A- قد يتأخر ظهور الأضداد المصلية حتى 3 أشهر
- B- يمكن تأكيد الإصابة بتحري وجود البروتين p-24 في البلازما أو بطريقة PCR
- C- يكون المصاب لا عرضياً خلال هذه الفترة غالباً
- D- يكون المصاب غير معد بالاتصال الجنسي
- E- يشاهد زيادة في تعداد اللمفاويات في الدم

اختر لكل إصابة مما يلي الصاد الحيوي المناسب (يمكن للخيار أن يتكرر)

45- التهاب سحايا بالرنويات pneumococcus meningitis

46- ذات عظم ونقي بالعنقوديات المقاومة للميثيسيلين

47- ذات رئة بالميكوبلاسما

48- التهاب سحايا باللايستريا leisteria

49- التهاب بلعوم بالمبيضات البيض candidiasis

50- التهاب مثانة بالزوائف الزنجارية pseudomonas

A- ampicilline

B- clarithromycine

C- vancomycine

D- aztreonam

E- fluconazole