

- 51- في التهاب اللوزتين/البلعوم بالعقديات المقيحة مايلي خطأ ماعدا
A- نصف حالات التهاب اللوزتين/البلعوم سببها العقديات المقيحة
B- وجود النقطة البيضاء على اللوزتين واسمة ومشخصة
C- العلاج الصحيح بقي من جميع الاختلاطات
D- لايجوز استعمال مركبات السولفا في العلاج
E- استئصال اللوزتين يؤمن وقاية أكيدة من الحمى الرثوية
- 52- كل مايلي عن النزلة الوافدة influenza خطأ ماعدا
A- غسيل الأيدي بالصابون غير كاف للقضاء على الفيروس
B- سبب الجائحات الكبرى تراجع مستوى المناعة ضد السلالات الموجودة
C- تستمر القدرة المرضية للفيروس خارج الجسم حوالي شهر في الحرارة العادية
D- يمكن أن تسبب ذات رئة معينة خاصة لدى كبار السن
E- ذروة طرح الفيروس في اليومين السابقين لبدء المرض
- 53- في الحمى المعوية (التيفية) كل مايلي صحيح ماعدا
A- فترة الحضانة ترتبط بكمية الجراثيم المتلعة
B- الأعراض الهضمية تحدث متأخرة في سير المرض
C- يمكن أن يحدث نزف هضمي رغم العلاج المناسب
D- إيجابية تفاعل التراص (فيبال) موجبة وليست مشخصة
E- نزاع الدم غير مفيد في الأسبوع الأول للمرض
- اختبر لكل مايلي مايوافقه (يمكن للخيار أن يتكرر)
54- إسهال مدمى مع نقص صوديوم الدم وضخامة كولون انسمامية
55- إسهال مائي مع إقباءات شديدة
56- إسهال مائي بدون مخض بطني أو إقباء
57- إسهال دهني
58- إسهال مدمى مع ضخامة عقد مسارية
59- العلاج النوعي مترونيدازول metronidazole
A- التسمم بالعتقديات الذهبية
B- الكوليرا cholera
C- داء اليرسينيا yersenia enterocolitica
D- داء الشيغلا shigellosis
E- داء الجيارديا giardiasis
- 60- كل مايلي عن التهاب الكبد-ج بفيروس HCV خطأ ماعدا :
A- احتمال العدوى بالاتصال الجنسي قليل مقارنة" ب HBV
B- احتمال تطوره نحو الإزمان قليل مقارنة ب HBV
C- اليرقان من أكثر العلامات مشاهدة في المرحلة الحادة
D- يوجد له لقاح فعال
E- تطوره سريع نحو التشمع
- 61- كل مايلي عن المستضد السطحي HBsAg صحيح ماعدا
A- وجوده دلالة أكيدة على الإصابة بفيروس التهاب الكبد-ب
B- يكون موجودا" عند الحمله الطبيعيين
C- اختفاؤه يسبق ظهور الأضداد النوعية له في طور الشفاء
D- يكون موجودا" في طور النافذة اللبية
E- تشكل الأضداد النوعية له يعطي مناعة دائمة
- 62- كل مايلي عن داء البروسلا brucellosis صحيح ماعدا
A- الإصابات السريرية تشاهد عند الكبار أكثر من الأطفال
B- يمكن أن تشاهد فيه ضخامة عقد بلغمية
C- لايمكن أن يشفى بدون علاج
D- زرع الدم التقليدي يحتاج لعنة أسابيع
E- الأضداد النوعية IgG تدل على إصابة حديثة أو ناكسة
- 63- تفيد الاختبارات التالية في تشخيص اللايشمانيا الحشوية عدا
A- تفاعل اللايشمانين الجلدي Montenegro
B- برز الطحال
C- برز نقي العظم
D- اختبار الفورمول-جل
E- التآلق المناعي
- 64- كل لمايلي عن الإصابة بالمقوسات الفوندية صحيح ماعدا
A- لايتقل بالرضاعة الطبيعية
B- الأدوية الموجودة تؤثر على النواشط فقط
C- غالبية الإصابات تحت سريرية
D- يمكن أن يسبب إجهاضات متكررة
E- العلاج غير ضروري عند أسوء المناعة

65- في خراجة الكبد الزحارية كل مايلي خطأ ماعدا

A- ترافق غالبا مع إصابة كولونية فعالة

B- غالبا متعددة

C- سلبية الاختبارات المصلية النوعية تنفي التشخيص

D- معظم الإصابات تشاهد في الأشخاص دون الـ 40 سنة

E- العلاج بالجراحة أو البرز

اختر لكل مايلي مايوافقه

66- HBsAg سلب مع HBcAb-total سلب و HBsAb

إيجابي

67- HBsAg إيجابي مع anti-HBc-IgM إيجابي

A- شخص منيع باللقاح النوعي لالتهاب الكبد-B

B- طور النافذة اللبية core window phase

C- التهاب كبد-B فعال

D- التهاب كبد-B غير فعال (حالة حمل طبيعي)

E- شخص أصيب وشفي من التهاب الكبد-B

68- في الإصابة بالنيسريا البنية كل مايلي خطأ ماعدا

A- معظم الإصابات لدى النساء تحت سريرية

B- لا يحدث تجرثم دم بلون إصابة تناسلية فعالة

C- الاختبارات المصلية النوعية مفيدة في التشخيص

D- العلاج المفضل حقنة وحيادة بنسلين مديد 2,4 مليون وحدة

E- يوجد لقاح فعال محضر من ذراري مضعة

اختر لكل مايلي مايوافقه

69- سيفالوسبورين جيل ثالث فعال ضد الزوائف pseudomonas

70- سيفالوسبورين جيل ثالث قد يؤدي لمحدوث ركودة صفراوية

71- إشراكها مع البيتا لكتام يزيد من فعالية البيتا لكتام (مؤازرة)

72- سيفالوسبورين جيل ثالث يعطى بالطريق الفموي

A- gentamycin

B- cefpodoxime

C- ceftriaxone

D- ciprofloxacin

E- ceftazydeme

73- كل مايلي عن الملاريا المنجلية خطأ ما عدا

A- الإصابات الشديدة تشاهد خاصة في الأطفال تحت عمر 6 أشهر

B- الإصابة الدماغية تحدث في حوالي 50 % من الحالات

C- العلاج النوعي لها هو الكلوروكين

D- الإصابة الدماغية لا تترك عقايل بعد الشفاء

E- قد يحدث فيها نكس بعد الشفاء

74- في الداء الزهري syphilis كل مايلي صحيح ماعدا

A- القرحة البدئية يمكن أن تحدث خارج الأعضاء التناسلية

B- البنسلين هو العلاج المفضل في كل مراحل المرض

C- يمكن للإصابة أن تنتقل إلى الجنين عبر المشيمة

D- ترافق الآفة البدئية مع ضخامة عقد بلغمية ناحية غير مؤلم

E- الاختبارات المصلية النوعية تصبح إيجابية من الأسبوع

الأول للإصابة

75- في الإصابة بفيروس HIV كل مايلي صحيح ماعدا

A- ينتقل بالرضاعة الطبيعية

B- تتأثر المناعة الخلوية أكثر من الخلطية

C- سلبية الاختبارات المصلية النوعية لا تنفي التشخيص

D- يكون المصاب غير معد في الفترة التي تسبق ظهور

الأضداد

E- يمكن أن تبقى الإصابة لأعرضية لأكثر من 20 سنة

76- في الإصابة بالكوليرا كل مايلي صحيح ماعدا

A- العدوى بالتسماس المباشر مع المريض شائعة

B- الجراثيم لا تخترق الغشاء المخاطي

C- الإسهال مائي ولا ترافق مع مقص معوي

D- تبقى الوظيفة الامتصاصية للأعضاء سليمة

E- تحدث مناعة فعالة بعد الإصابة نتيجة تشكل أضداد

موضعية من نوع IgA

77- كل مايلي عن داء وحيدات النوى الإنفاني خطأ ماعدا

A- غالبية الإصابات تحدث في عمر تحت 12 سنة

B- تحدث فيها ضخامة طحال غير مؤلمة

C- الفيروس يصيب ويتكاثر ضمن اللعقاويات الثانية

D- سلبية اختبار البقعة الوحيدة monospot يعني

التشخيص

E- من الاختلاطات تمزق الطحال العفوي

78- الإصابة المفصلية الالتهابية يمكن أن تحدث في

A- داء لايم

B- السيلان البني

C- داء البروسيلا

D- الالاشمانيا الحشوية

E- الإصابة بالبرسبينا المعوية الكولونية

79- في الإصابة بالعمول البسيط التناسلي كل مايلي صحيح ماعدا

A- تزهب للإصابة بفيروس HIV

B- أكثر العوامل المسببة للقرحات الأعضاء التناسلية

C- قد تسبب التهاب غدة بارثولين وحيدة الجاذب

D- وجودها لدى الأم الحامل في الفترة الأخيرة للحمل يستوجب

الولادة الجراحية (القيصرية)

E- العلاج ضروري لدى ناقصي المناعة

80- كل مايلي خطأ ماعدا :

A- يكون تركيز السكر في س.د.ش منخفض في التهاب السحايا الدرني

B- يكون ضغط الانفتاح مرتفع في التهاب السحايا الفيروسي

C- لا تفيد اختبارات الفحص باللاتكس على س.د.ش بعد البدء

باستخدام الصادات الفعالة

D- تزداد نسبة الإصابة بالتهاب السحايا الدرني (بالمستخدمة النزلية) مع تقدم العمر

E- يزيد إعطاء جرعات صغيرة من الستيرويدات في نفوذية الصادات الحيوية إلى س.د.ش

81- في التهاب السحايا بالعديديات الرئوية كل مايلي صحيح عدا

A- تزداد الإصابة بها في فصل الشتاء

B- يصاب بها الشباب أكثر من الأطفال

C- إنذارها أسوأ من الإصابة بالنايسريا السحائية

D- المحفظة الخارجية أهم عناصر القوقعة فيها

E- عند الشك بها يجب البدء بالعلاج بالفانكومايسين

82- كل مايلي خطأ ماعدا :

A- اللقاح رباعي القوى المضاد للسحائيات لا يعطى لمرضى فقر الدم المنجلي

B- اللقاح عديد القوى المضاد للرئويات لا يعطى لمرضى القصور الكلوي المزمن

C- لقاح التهاب الكبد-B لا يعطى لمرضى نقص المناعة المكتسب AIDS

D- يحظر إعطاء جرعة داعمة للكرز للمرأة الحامل

E- ينصح بإعطاء لقاح ال Hib لمن هم فوق 65 سنة

83- في التهاب السحايا الفيروسي كل مايلي صحيح ماعدا

A- البدء مفاجئ

B- غالبية الإصابات تشاهد في نهاية الفصل الحار وبداية الخريف

C- تحديد نوع الفيروس غير مفيد لعدم وجود علاج نوعي

D- لا يمكن تفريقها سريريا عن التهاب السحايا الفيحي

E- معظم الإصابات تحدث لدى الأطفال والشباب

84- كل مايلي صحيح عدا

A- الكولونيات المفردة للزيفان المعوي ETEC تسبب

إسهالا بشبه الكوليرا

B- الكولونيات الغازية للأعما EIEC قد تسبب إسهالا

يشبه الزحار المعوي

C- فيروس روتا من أهم العوامل المسببة للإسهال لدى

الأطفال دون عمر الستون

D- الإنسان هو المستودع الرئيسي للكولونيات النزفية

E- الإصابة بالكامبيلوباكتر الصائمية قد تلتبس بالتهاب الزائدة الدودية

85- يحظر إعطاء الصادات الحيوية في (إجابة وحيدة) :

A- داء الشيغلا (الزحار المعوي)

B- داء السالمونيلا salmonellosis

C- التهاب الأمعاء بالكولونيات النزفية E.H.E.C.

D- داء الجيارديا giardiasis

E- الإصابة بالكامبيلوباكتر الصائمية

86- كل مايلي عن داء الشيغلا صحيح عدا

A- الجراثيم تفرز زيفانا فعالا له تأثيرات عصبية

B- العدوى بين الأشخاص غير واردة

C- من اختلاطاته ضخامة الكولون السمية

D- الإصابة تبقى محصورة في الشتاء المخاطي للكولون دون حدوث تجرثم دم

E- التشخيص الأكيد يعزل الجراثيم أو زيفانها من البراز

87- في كيسة الكبد المائية hydatid cyst كل مايلي خطأ

عدا

A- تدخل في التشخيص التفريقي للحمى مجهولة السبب

B- تحدث زيادة في تعداد الكريات البيض على حساب اللمفاويات

C- اليرقان السريري من الأعراض المبكرة

D- العلاج المفضل بالاستئصال الجراحي

E- الكيسات الصغيرة قد تستجيب للعلاج الدوائي بالألبنديزول

albendazole

88- المعالجة العرضية للحمى ضرورة فيما يلي عدا

A- القصور القلبي

B- داء الصرع

C- حدوث الهذيان

D- الصدمة الحرارية

E- الصدمة الإنتانية

89- كل مايلي خطأ عدا:

- A- زرع الدم النظامي يحتاج 15-20 مل لكل عملية زرع
B- احتواء عينة التشحيع على كثير من الخلايا البطانية يدل على أن منشأها من الشجرة القصبية
C- بقاء العينات معرضة للهواء 10 دقائق كاف لقتل معظم الجراثيم اللاهوائية
D- سمينة منتصف البول مقبولة للزرع لدى الذكور
E- نمو المبيضات البيض بزرع البراز لا يعتبر حالة مرضية

90- كل مايلي عن داء البريميات leptospirosis صحيح عدا

- A- العدوى تتم عبر الجلد والأغشية المخاطية
B- الإصابة المميزة فيها هي اعتلال أوعية منتشر
C- الحمى تكون ثنائية الطور في نصف الحالات
D- في الحالات الشديدة يحدث يرقان مع تظاهرات نزفية وعصبية
E- أفضل وسيلة لتشخيص بزل نقي العظم

اختر لكل مايلي مايناسبه (يمكن للخيار أن يتكرر)

- 91- داء الحصار القلبي
92- التهاب شبكية ومشيمية
93- التهاب أوعية منتشر
94- يرقان مع مظاهر نزفية
95- توسع واضح في النصف بدون ارتشاحات رئوية
96- التهاب مشيمية أمامي

A- داء المفوسات Toxoplasmosis

B- داء البريميات Leptospirosis

C- الالتهاميا الحشوية Kala Azar

D- داء لايم Lyme disease

E- الجمرة الخبيثة Anthrax

اختر لكل مايلي مايناسبه

- 97- فرفريات خاصة على الجذع والأطراف
98- آفات قحطية مع نخر مركزي فيها ووذمة حولها
99- احمرار الجلد

A- تجرثم الدم بالتائيسريا

B- تجرثم الدم بالزوائف الزنجارية Pseudomonas

C- تجرثم الدم بالشيغلا Shigellosis

D- متلازمة الصدمة الإنتانية Toxic shock syndrome

E- المتلازمة البوريمائية الانحلالية

100- كل مايلي عن داء لايم صحيح عدا

- A- يمر بثلاثة أطوار: جلدي-عصبي-مفصلي
B- ينتقل إلى الإنسان بواسطة البعوض
C- المستودع الرئيسي له هو الفزلان والقران ذات القدم البيضاء
D- يتميز بحدوث اندفاع جلدي في الطور الأول يسمى الحمامي المزمة الممتدة ECM
E- قد يسبب شلل في العصب الوجهي