

امتحان الجراحة البولية و العصبية - الدورة الفصلية الأولى - سنة خامسة طب بشري للعام ٢٠١٧-٢٠١٨ نموذج B

- D- يشيع وجود الجذر
٧- كلية نعل الفرس: كل ما يلي صحيح عدا:
A- هو النمط الأكثر شيوعاً للانتحام
B- يكون القطبان السفليان أقرب لجسام الفقرات مما هو في الحالة الطبيعية
C- تتوضع كؤوس القطب السفلي وحشي الخالب
D- لا يشكو معظم المرضى من أعراض
٨- في الألم الكلوي الحاد: كل ما يلي صحيح عدا
A- يكون ناتجاً عن تمدد مفاجئ في محفظة الكلية
B- يكون عادة قولنجي الطبيعة
C- يرتاح المريض بالاستلقاء ضاماً فخذه إلى بطنه
D- يترافق مع غثيان و إقياء
٩- تشمل الأعراض التبولية الانسدادية:
كل ما يلي صحيح عدا:
A- الإلحاحية
B- التردد في بداية التبول
C- ضعف رشق البول
D- الحس بعدم الإفراغ الكامل
10- في الفحص السريري للكليتين كل ما يلي صحيح عدا:
A- أفضل الطرق لجس الكلية عندما يكون المريض بالاستلقاء
B- الكلية اليمنى تكون أخفض قليلاً من اليسرى
C- تكون الكلية في الحالة الطبيعية مؤلمة
D- تشير الطبيلة الكولونية أمام الكتلة لموقعها خلف البريتوان
11- في المثانة العصبية الرخوة: يحدث ما يلي عدا:
A- سعة كبيرة
B- رتوج شديدة جداً
C- فقد التقلصات الإرادية لعضلة المثانة
D- نقص مقوية العضلة الخارجية
12- كل الأدوية التالية تسبب الانسداد عدا:
A- نورإيبينفرين
B- بروستاغلاندين E1
C- مثبطات PD-5

- ١- مضادات استقطاب الأمواج الصادمة من خارج الجسم: كل ما يلي صحيح عدا:
A- حصة أكبر من ٢ سم
B- ناظم الخطى
C- اضطرابات التخثر
D- حصة سادة مع ارتفاع الحرارة
٢- في التهاب الحويضة و الكلية الحاد كل ما يلي صحيح عدا:
A- يحدث ألم بالخاصرة
B- يكون الإنتان عادة دموي المنشأ
C- تجري ال VCUG بعد الانتظار عدة أسابيع
D- تعالج الحالات غير المعقدة بالفلوروكينولون الفموي
٣- التهاب الحويضة و الكلية الورمي الحبيبي الأصفر:
كل ما يلي صحيح عدا:
A- هو انتان برانشيمي كلوي مزمن
B- نجد فيه ألم و كتلة في الخاصرة
C- يظهر ال CT كتلة كلوية مع تكتلات مركزية
D- يعالج بالصادات
٤- التدرن البولي التناسلي: كل ما يلي صحيح عدا:
A- يحدث بشكل ثانوي لإنتان رنوي أولي
B- في البداية تحدث أعراض تبولية تهيجية
C- يحدث عادة ألم كلوي المنشأ
D- تحدث بيلة دموية
٥- في الكلام القهجي: كل ما يلي صحيح عدا:
A- هو التهاب حويضة و كلية مختلط باستسقاء كلوي انسداد
B- يبدي ال IVU مظهر أكل العث المميز في الكؤيسات
C- يتم تدبيره بالصادات الوريدية و إزالة الانسداد
D- يمكن لقوق الصوت أو ال CT كلوي أن يوضحا التشخيص
٦- الكلية الحوضية: كل ما يلي صحيح عدا:
A- يكون حاليها قصيراً
B- ترعيتها دائماً من الأهر مثل الكلية الطبيعية
C- يشيع وجود شذوذات بولية تناسلية مرافقة

- D- نيتروغليسرين
١٣- في مرضى العقم: كل ما يلي صحيح عدا:
A- توجعنا الخصية اللينة نحو سبب إفرازي
B- عندما يكون البريخ طبيعي فالعقم إفرازي عادة
C- ندرة المنى هي أقل من ٤٠ مليون نطفة في المقدوف
D- يكون PH السائل المنوي الطبيعي حمضي
١٤- كل ما يلي يعتبر عوامل خطورة للإصابة بالحصيات البولية عدا:
A- مهنة الطب
B- البلدان الغنية
C- المناخ البارد
D- تناول اللحوم
١٥- تفضل أسباب فرط حمض البول في البول دون فرط حمض البول في الدم ما يلي عدا:
A - حالات الإسهال المزمن
B- تناول الساليسيلات
C- الأيبضااض الحاد
D- تناول التيازيدات
١٦- في أعراض و علامات حصيات البولية كل ما يلي صحيح عدا:
A- تعتبر الحصيات الكاسية نمطاً مسؤولاً عن الألم بشكل أساسي
B- يكون انحشار الحصاة في الوصل الحويضي الحالي مسؤول عن القولنج الكلوي
C - تترافق حصيات الحالب القطني مع ألم يتشعع إلى الصفن
D- تترافق حصيات الحالب القاصي مع علامات تهيج المثانة
١٧- الكلية عديدة الكيسات ذات الصبغية الجسدية السائدة ADPKD: كل ما يلي صحيح عدا:
A- يحدث تنكس كيسي مترقي أحادي الجانب
B- يظهر لدى البالغين
C- يحدث فرط توتر شرياني
D- تحدث بيلة دموية مجهرية أو عيانية
١٨- تصنيف بوسنيك III لكيسات الكلية : كل ما يلي صحيح عدا:
A- ٥٠% منها تكون خبيثة
B- يوجد حواجز ثخينة
C- تكلسات غير منتظمة
D- يمكن معالجتها دون جراحة
١٩- انسداد الوصل الحويضي الحالي: كل ما يلي صحيح عدا:
A- قد يحدث من ضغط خارجي بوعاء شاذ
B- تتظاهر معظم الحالات بسبب البيلة الدموية و الانتان البولي عند حديثي الولادة
C- يتم التشخيص بالإيكو في الفترة قبل الولادة
D- يشكل التفريس الكلوي بال MAG3 مع المدر جزءاً من الاستقصاءات
٢٠- الخصية غير النازلة: كل ما يلي صحيح عدا:
A- سوف ينزل معظمها بعمر السنة
B- تصبح الخصية معرضة لخطر أعلى ب ٢٠ مرة لحدوث السرطان
C- يحدث تخرب في أعداد خلايا ليدغ المبكر بعمر السنتين
D- تعالج بالجراحة بعمر بين ١٢-١٨ شهر
٢١- يصنف الجذر المثاني الحالي مع توسع حالب و حويضة خفيف : اختر الإجابة الصحيحة:
A- درجة I
B- درجة II
C- درجة III
D- درجة IV
٢٢- ورم الخصية الذي ينتج ال AFP بعلامات عالية هو: اختر الإجابة الصحيحة
A- السرطانة المشيمية
B- ورم الكيس المحي
C- السيمينوما الصرف
D- الورم المسخي
٢٣- يعالج المرضى الذين لديهم سيمينوما خصوي مع كتل أكبر من ٥ سم خلف البريتوان ب: اختر الإجابة الصحيحة:
A- معالجة شعاعية للعقد اللمفية حول الأبر و الحوضية و الإربية بالجهتين
B- معالجة كيميائية بدنية معتمدة على البلاتينيوم
C- تجريف العقد اللمفية خلف البريتوان
D - معالجة شعاعية للعقد اللمفية حول البهر و فوق الحجاب الحاجز

٢٤- يعتبر ما يلي من التناثرات نظيرة الورمية في سرطان الخلية الكلوي : اختر الإجابة الصحيحة

- A- نقص كلس الدم
 - B- فقر الدم
 - C- ارتفاع التوتر الشرياني
 - D- سوء الوظيفة الطحالية
- ٢٥- الطريقة الفضلى لتقييم الكتلة الكلوية هي : اختر الإجابة الصحيحة:

- A- IVU
- B- CT قبل و بعد حقن المادة الظليلة عبر الوريد
- C- MRI
- D- تصوير الشريان الكلوي

٢٦- أشيع خبيثات السبيل البولي التي تحدث في الطفولة: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- سرطان الخلية الكلوية
 - B- ورم ويلمس
 - C- ورم المثانة
 - D- سرطان البروستات
- ٢٧- أشيع المناطق في البروستات للإصابة بالسرطان هي: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- المنطقة الانتقالية
 - B- المنطقة المركزية
 - C- المنطقة المحيطة
 - D- المنطقة الليفية الأمامية
- ٢٨- في سرطان المثانة، اختر الإجابة الصحيحة:
- A- لا علاقة للتدخين به
 - B- T1 هو سرطان غاز للعضلات
 - C- أشيعها هي أورام الخلية الحرشفية
 - D- يشكل تعدد البيلات و الإلحاحية التبولية جزءاً من الأعراض

٢٩- المعالجة المفضلة كخطوة أولى عند الإصابة بالسرطانة بالمكان (carcinoma in situ) في المثانة هي التستيل داخل المثانة بال : اختر الإجابة الصحيحة:

- A- سيكلوفوسفاميد
- B- Thiotepa
- C- BCG
- D- mitomycin-C

٣٠- طفل عمره ٣ سنوات ، لديه كتلة بطنية تمتد عبر الخط الناصف مع حمى و ألم عظمي مع جحوظ بالمقلة و

ارتفاع ضغط الدم مع مستويات مرتفعة من الفانيليل مائيليك أسيد و الهوموفانيليك أسيد في البول: التشخيص الأكثر احتمالاً هو: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- ورم ويلمس nephroblastoma
 - B- ورم الأرومة العصبية neuroblastoma
 - C- متلازمة كوشينغ
 - D- ورم القواتم pheochromocytoma
- ٣١- السبب الأكثر شيوعاً للقسوح هو: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- فرط استهلاك الكحول
 - B- داء الخلايا المنجلية
 - C- الرضوح
 - D- حقن البافيرين داخل الجسم الكهفي
- ٣٢- في تشخيص القسوح ، اختر الإجابة الصحيحة:
- A- انتصاب متقطع < ٢ ساعة
 - B- وجود رغبة جنسية
 - C- تكون حشفة القضيب رخوة
 - D- الجسمين الكهفيين يكونان صلبين بشكل جزئي في القسوح منخفض التدفق

٣٣- في انفصال الخصية : اختر الإجابة الصحيحة:

- A- يحدث الانفصال خارج الغلالة لدى حديثي الولادة
- B- يحضر الأطفال في الانفصال خارج الغلالة بالأم شديد جداً و كتلة مؤلمة جداً
- C- في الانفصال داخل الغلالة رفع الصفن يريح الألم (علامة Prehn إيجابية)
- D- يكون تحليل البول عادة إيجابي

٣٤- في القيلات المائية الخلقية يجب إجراء العمل الجراحي بعد: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- أسبوع
- B- شهر
- C- سنة
- D- ٥ سنوات

٣٥- في رضوض الكلية، اختر الإجابة الصحيحة:

- A- الكلية هي العضو الأقل إصابة في رضوض الجهاز البولي
- B- غياب البيلة الدموية لا يستبعد الأذية الكلوية
- C- تعالج الرضوض النافذة غالباً بشكل محافظ
- D- لا تشكل البيلة الدموية العيانية بعد الرض استطباً لإجراء دراسات تصويرية

٣٦- في رضوض الإهليل الخلفي ، اختر الإجابة الصحيحة:

- A- تكون ناتجة عادة عن سقوط بوضعية الامتطاء
 - B- الموقع الأساسي للأذية هو الوصل المؤتي الفشائي
 - C- يحدث عادة تكدم عجاني (ورم دموي بشكل فراشة)
 - D- يكون التدبير بنزح البول فوق العانة من أسبوع إلى ٣ أسابيع ثم الجراحة
- ٣٧- النمط الأكثر شيوعاً للإبرار بعد الانسداد البولي هو: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- إبرار الملح
- B- إبرار البولة
- C- إبرار الماء
- D- إبرار الغلوكوز

٣٨- في ضخامة الموثة الحميدة BPH : اختر الإجابة الصحيحة:

- A- متوسط العمر الذي يبدي أعراضاً هو بين ٤٥ و ٥٥ سنة
 - B- ينشأ ال BPH في المنطقة المحيطة
 - C- لا يتناسب حجم كامل البروستات في ال BPH مع درجة أعراض الانسداد
 - D- لا علاقة لل BPH مع التقدم بالعمر
- ٣٩- في الورم الشحمي العضلي الوعائي الكلوي: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- هي عادة أورام حميدة
- B- تكون غالباً أحادية الجانب
- C- نمط ظهورها على التصوير الوعائي مميز
- D- ال CT غير مشخص

٤٠- في سرطان الخلية الكلوية RCC ، النمط النسيجي الأكثر شيوعاً هو: اختر الإجابة الصحيحة:

- A- حليمية أليفة اللون
- B- خلية راتقة اعتيادية
- C- السرطانة الكارهة للون
- D- غير المصنفة

٤١- ان مريض بعمر ٥٠ سنة لديه : صداع + إقياء + صلابة نقرة + رهاب ضوء (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. هو مريض لديه حتماً نزف تحت العنكبوت من أم دم ويجب أن يحضر مباشرة للعمل الجراحي
- B. هو مريض لديه التهاب سحايا ويجب أن يعالج فوراً بالمضادات الحيوية المناسبة

C. تعتبر هذه علامات سحائية ويجب إجراء الدراسة المناسبة لوضع التشخيص والبدء بالمعالجة

D. هذه الأعراض قد تكون عابرة لذلك يجب مراقبة المريض

٤٢- ينجم استسقاء الرأس الانسدادي عن (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. فرط إفراز المسائل الشوكي من الصفائر المشيمية
- B. النزف تحت العنكبوت الذي يسبب تندب الزغابات العنكبوتية
- C. أورام الفص الجبهي
- D. أورام البطين الثالث كالكيسة الغروانية

٤٣- في الضمور الدماغى واستسقاء الدماغ (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. تتوسع البطينات في كليهما
- B. تغيب المسافة تحت العنكبوتية في كليهما
- C. العلاج هو الثنت الدماغى في كليهما
- D. التشخيص يتم بقياس محيط الرأس في كليهما

٤٤- القيلة السحائية الدماغية القفوية (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. هي شذوذ خلقي يحدث بعد الولادة
- B. يتألف كيس القيلة من الجلد والأنسجة الليفية و الشحمية
- C. العلاج جراحي والإنذار جيد حيث يعيش جميع الأطفال حياة طبيعية بعد الجراحة
- D. يكون هناك نقص عظمي في الجسمة مع تشكل كيسي يحتوي نسيج دماغي

٤٥- في شلل كلميكة أو شلل القسم السفلي للعضدية العضدية (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. يتأذى الجذرين الرقبين الخامس والسادس
- B. يتأذى العصب الزندي وتضعف عضلات اليد الداخلية
- C. تضعف فيه العضلة ذات الرأسين العضدية ولا يستطيع المريض عطف الساعد
- D. العلاج فيه جراحي

٤٦- إن إصابة العصب الكبيرى تحدث في كسور الثلث المتوسط للعضد وتسبب (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. ضعف عطف الساعد
- B. ضعف بسط الساعد
- C. ضعف تبعيد العضد

- ٥٣- في ارتجاج الدماغ (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. التصوير الطبقي يظهر سلامة النسيج الدماغي
- B. قد يحدث فيه صدادع أو إقياء
- C. العلاج عرضي وأحياناً يضطر للعمل جراحي
- D. لا يترافق بنزف دماغي

- ٥٤- في الورم النموي فوق الجافية (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. يتوضع فوق الجافية
- B. يشخص بالتصوير الطبقي ويظهر على شكل عسة محدبة الوجهين
- C. ينجم عن إصابة الشريان المخي الأوسط
- D. ينجم عن إصابة الشرايين السحائية أو فروعها

- ٥٥- في ارتجاج النخاع (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. ظهور أعراض حسية حركية مباشرة بعد الرض
- B. ظهور الأعراض تحت مستوى الرض
- C. الأعراض مؤقتة وتزول نهائياً
- D. التصوير بالرنين المغناطيسي يظهر كدمة نخاعية

- ٥٦- في الخشخيشات التي تحدث بعد الإصابات النخاعية (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. تحدث في أماكن التواءات العظمية كنتيجة للاستلقاء المديد
- B. في حال حدوثها تترك بدون علاج لأنها تشفى عفواً
- C. الوقاية منها تكون بالتقليب المستمر واستخدام الفرشة الهوائية
- D. تشاهد في إصابات النخاع التامة

- ٥٧- في الأورام السيسائية الدماغية (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. التناثر الأساسي هو ارتفاع التوتر داخل القحف
- B. عند الكبار تنمو فوق الخيمة
- C. هذه الأورام تعالج جراحياً مع علاجات متممة كيميائية وشعاعية والإنذار جيد
- D. عند الصغار تكون تحت الخيمة
- ٥٨- في الورم القحفي البلعومي (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. هي أورام سليمة

- D. هبوط اليد
- ٤٧- إن انقطاع العصب المتوسط في العضد يعطي أذية عصبية في اليد تعرف بـ (اختبر الإجابة الصحيحة)
- ١- يد المخلب
- ٢- يد القرد
- ٣- متلازمة نفق الرسغ
- ٤- هبوط اليد

- ٤٨- متلازمة النفق المرفقي أو شلل الزندي البطيء (اختبر الإجابة الصحيحة)
- A. تحدث بسبب انضغاط العصب الزندي في الرسغ
- B. الضعف والضمور العضلي يكون بعضلات الضرة في اليد والعضلات بين الأصابع
- C. العلاج نوماً محافظ
- D. التشخيص الأكيد يكون بالفحص السريري والقصة المرضية

- ٤٩- تضعف العضلة مربعة الرأس الفخذية في (اختبر الإجابة الصحيحة)
- A. إصابة العصب الوركي
- B. إصابة العصب الفخذي الجدي الوحشي
- C. أذية الضفيرة العجزية
- D. فتق النواة اللبية الكبيرة في المستوى ق٣ق٤
- ٥٠- تتأثر الساحة البصرية في كل ما يلي عدا (اختبر الإجابة الخاطئة)

- A. أورام جانب السرج التركي
- B. أورام أو أذيات الفص القوي
- C. أورام أو أذيات الفص الجداري
- D. أورام النخاسي الكبيرة

- ٥١- يستخدم التصوير الطبقي المحوري في تشخيص (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. أورام الدماغ
- B. كسور الجمجمة
- C. النزف الدماغي
- D. التهاب السحايا

- ٥٢- في كسور القاعدة الوسطى الرضوي يحدث (اختبر الإجابة الخاطئة)
- A. نز دموي أو سائل شوكمي من الأنف
- B. نز دموي أو سائل شوكمي من الأذن
- C. إصابة العصب الوجهي السابع
- D. إصابة العصب السمعي الثامن

٦٤- التحام الدرز السهمي الباكر (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. يحدث نتيجة اضطراب تشكل عظام الجمجمة أثناء الحياة الرحمية
- B. التشخيص يكون بالتصوير الطبقي المحوري
- C. العرض الباكر هو تشوه الجمجمة وتأخذ الشكل الزورقي
- D. عندما يكون غير معالوض تظهر أعراض ارتفاع التوتر داخل القحف والعلاج محافظ

٦٥- متلازمة مخرج الصدر (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. تنجم عن وجود ضلع في الفقرة الظهرية الأولى
- B. تضغط الضفيرة العضدية في قسمها السفلي
- C. ينضغط فيها الشريان تحت الترقوة
- D. العلاج جراحي في الحالات المتقدمة

٦٦- يحدث هبوط القدم في (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. إصابة العصب الشظوي عند رأس الشظوية
- B. إصابة العصب الوركى
- C. إصابة العصب الظنبوبي
- D. فتق التواء اللببة الكبير في المستوى ق٤ق٥

٦٧- متلازمة نفق الرسغ (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. تحدث بسبب انضغاط العصب المتوسط بقيد القابضات في نفق الرسغ
- B. تصيب الرجال أكثر من النساء
- C. تشدد الأعراض ليلاً
- D. التشخيص الأكيد يكون بتخطيط الأعصاب

٦٨- تستخدم الجراحة الوظيفية لعلاج (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. الصرع عند فشل العلاج المحافظ
- B. الأورام كالعلاج دأمة بعد الاستئصال الجراحي
- C. داء باركنسون عند فشل العلاج الدوائي
- D. ألم مثلث التوائم عند فشل العلاج الدوائي

٦٩- في تضيق القناة الفقرية القطنية (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. يحدث ألم ينتشر نحو الطرفين السفليين
- B. يحدث العرج المتقطع العصبي
- C. التشخيص يكون بالرنين المغناطيسي والطبقي
- D. يكون النبض غائبا بجس شرايين ظهر القدم

٧٠- في الحبسة التعبيرية (اختر الإجابة الصحيحة)

- A. يستطيع المريض فهم الكلام لكنه لا يستطيع صياغة الكلام

B. تتوضع في منطقة السرج التركي

C. قد تترافق بأعراض بصرية

D. هي أورام تنمو بسرعة كبيرة

٥٩- إن تمزق أم دم يسبب (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. صلاية نقرة + صداع
- B. أعراض فص قفوي عندما تتمزق أم دم على حساب المخي الخلفي
- C. أعراض فص صدغي عندما تتمزق أم دم على حساب المخي المتوسط
- D. أعراض فص جبهى عندما تتمزق أم دم على حساب الشريان الاتصالي الأمامي

٦٠- التشنج الوعائي الناجم عن النزف تحت العنكبوت من امهات الدم (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. يحدث بعد اليوم الثالث من النزف
- B. تعطى حاصرات اقنية الكالسيوم كالنيموديين
- C. تستخدم محاليل خاصة لزيادة حجم الدم وملاً السرير الوعائي
- D. يجرى تخفيض الضغط كوقاية من عودة النزف من أم الدم

٦١- يحدث استسقاء الدماغ المتصل بسبب نقص

امتصاص السائل في الزغابات تحت العنكبوتية والذي يشاهد في (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. النزف تحت الجافية
- B. النزف تحت العنكبوت الرضي
- C. النزف تحت العنكبوت القفوي
- D. التهاب السحايا

٦٢- الشوك المشقوق الخفي (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. يحدث نتيجة عدم التحام القوس الخلفية لل فقرات دون مشاركة السحايا والنسيج العصبي
- B. يكشف بالصدفة وأكثر ما يحدث في الفقرة القطنية الخامسة
- C. العلاج جراحي والنتائج جيدة
- D. يكون لا عرضي

٦٣- تشوه أرنولد كيارى (اختر الإجابة الخاطئة)

- A. هو تشوه خلقي يحدث فيه توسع كيسى في البطن الرابع اضطراب تشكل المخيخ وغياب الدودة
- B. هو تشوه خلقي يحدث فيه درجات متفاوتة من هبوط عناصر الحفرة الخلفية عبر الثقبة العظمى
- C. هو تشوه خلقي يعالج جراحيا
- D. هو تشوه خلقي يشخص بالرنين المغناطيسي

- D. هي أورام بطينة النمو وتحوي تكلسات
- ٧٧- يتميز الصداع في ارتفاع التوتر داخل القحف الناتج عن أورام الدماغ (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. يكون الصداع صباحي وفي النصف الأخير من الليل
- B. يكون الصداع ظهرا
- C. يكون الصداع عصرا
- D. يكون الصداع مساء
- ٧٨- إن حدوث صداع حاد مفاجئ عند مريض بعمر ٤٠ سنة لم يختبره من قبل (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. يجب أن يعد نزف تحت العنكبوت حتى يثبت العكس
- B. يجب أن يشك بنزف فوق الجافية ويحتاج تداحل إسعافي
- C. هو صداع ورمي ويجب أن يشخص بالرنين المغناطيسي
- D. هو حتما شقيقة ويجب أن يعالج معالجة فورية ومناسبة
- ٧٩- إن أشيع سبب للنزف العفوي تحت العنكبوت عند الأطفال هو (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. التشوهات الشريانية الوريدية
- B. امهات الدم الدماغية
- C. استسقاء الدماغ
- D. التهاب السحايا
- ٨٠- يتم تشخيص أم الدم بعدة طرق ولكن الاستقصاء الذهبي الذي يشخص ويحدد خطة العلاج هو (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. الرنين المغناطيسي الوعائي
- B. الطبقي المحوري
- C. الدوبلر عبر القحف
- D. التصوير الوعائي لشرابين الدماغ

- B. لا يستطيع المريض فهم الكلام
- C. يستطيع المريض فهم الكلام و يستطيع صياغة الكلام
- D. لا يستطيع المريض فهم الكلام ولا يستطيع صياغة الكلام
- ٧١- في أورام الدماغ السحائية يتأثر الشم عندما يتوضع الورم في (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. الحفرة الخلفية
- B. الحفرة المتوسطة
- C. الحفرة الأمامية
- D. الفص القفوي
- ٧٢- يعصب العصب الوجهي (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. عضلات اللسان
- B. حس الوجه
- C. عضلات الكتف
- D. عضلات الوجه
- ٧٣- يتأثر العصب السمعي الدهليزي في (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. أورام الفص الجبهي
- B. أورام الفص الجداري
- C. أورام الزاوية الجسرية المخيخية
- D. أورام السبيل البصري
- ٧٤- في التصوير بالرنين المغناطيسي يكون السائل الدماغى الشوكي (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. زائد الإشارة في الزمن الأول
- B. ناقص الإشارة في الزمن الأول
- C. ناقص الإشارة في الزمن الثاني
- D. معادل الإشارة في الزمن الأول
- ٧٥- في رموض العمود الفقري أكثر المناطق اصابة (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. المنطقة الرقبية والوصل الظهرى القطني
- B. الوصل القطني العجزي
- C. المنطقة الظهرية
- D. المنطقة العجزية
- ٧٦- في الاورام الدبقية قليلة التغصنات (اختر الإجابة الصحيحة)
- A. هي أورام خبيثة جدا وتنتقل خارج الدماغ
- B. هي أورام انتقالية
- C. العلاج كيميائي ولا تحتاج استئصال جراحي

