

أسئلة أمراض الكلية ٢٠١٧-٢٠١٨

٥ - يفضل عدم التصوير الظلوي في الحالات التالية ما عدا :

- A - الحصيات الكلوية ثنائية الجانب .
- B - اعتلال الكلية السكري .
- C - الورم النقوي العديد .
- D - المسنين المصابين بالجفاف .
- E - قصور القلب الاحتقاني الشديد .

٦ - كل ما يلي يعتبر مضاد استقلاب لخزعة الكلية غير الجلد ما عدا :

- A - اضطرابات التخثر .
- B - ارتفاع التوتر الشرياني غير المضبوط .
- C - سرطان الكلية .
- D - كلية وحيدة .
- E - قصور الكلوي الحاد .

٧ - في فحص البول والراسب الطبيعي كل ما يلي صحيح ما عدا :

- A - نخل عادة كثافة البول خلال النهار .
- B - لا يعني اللون الأحمر دائماً وجود بيلة دموية .
- C - لا يوجد أي أثر للسكر .
- D - يعتبر وجود أي كمية من البروتين مرضياً .
- E - يوجد عادة كمية قليلة من الكريات الحمر والكريات البيض والاسطوانيات .

٨ - فيما يتعلق بالرشح الكبلي واحد مما يلي صحيح :

- A - ليس من الضروري أن ينقص في القصور الكلوي الحاد .
- B - ليس من الضروري أن ينقص في القصور الكلوي المزمن .
- C - يزداد مع تقدم العمر .
- D - يزداد في الحمل الطبيعي .
- E - كل ما سبق خطأ .

٩ - في الكلية الطبيعية واحد مما يلي صحيح :

- A - الكلية اليسرى أطول من اليمنى عادة .
- B - الرشح الكبلي حوالي ٨٠ / ليتر / ٢٤ ساعة .
- C - تكثف المرأة البول أكثر من الرجل .
- D - يبدأ ارتسام الكريسات بعد عشر دقائق من حقن المادة الظليلة بالوريد .
- E - تزداد كثافة البول بزيادة تناول السوائل السكرية .

١ - كل ما يلي يتظاهر عادة بمتلازمة نفروزيّة ما عدا :

- A - داء التبدلات الطفيفة .
- B - التهاب الكبد والكلية الغشائي .
- C - التهاب الكبد والكلية المنمي الغشائي .
- D - الكلية عديدة الكيسات .
- E - التهاب الكبد والكلية الجزئي الموضع .

٢ - في التهاب الكبد والكلية الغشائي كل ما يلي صحيح ما عدا :

- A - سبب شائع للمتلازمة النفروزيّة عند الكبار .
- B - هو عادة مرض مزمن مع فترات من الهجوع .
- C - هو دائماً بدني .
- D - أحد أمراض المعقدات المناعية .
- E - تستمر الوظيفة الكلوية جيدة لأكثر من ١٠ سنوات عند ٥٠% من المرضى .

٣ - في التهاب الكبد والكلية الجزئي القطعي نجد ما يلي ما عدا :

- A - بيلة بروتينية نفروزيّة أو غير نفروزيّة .
- B - تكون المتممة عادة ناقصة .
- C - قد يكون بدنياً أو ثانوياً .
- D - قد نجد قصوراً كلوياً .
- E - لإعطاء الستيرويدات و قامعات المناعة بعض الفائدة .

٤ - في داء التبدلات الطفيفة نجد ما يلي ما عدا :

- A - بيلة بروتينية شديدة .
- B - نقص بروتينات الدم .
- C - بيلة دموية .
- D - فرط شعوم الدم .
- E - وذمات .

١٠ - فيما يتعلق بالبيلة البروتينية كل مايلي صحيح
ماعدا :

- A - وجود أي أثر في البول يعتبر مرضياً .
- B - التفروز يترافق ببيلة بروتينية شديدة .
- C - البيلة البروتينية الانتقائية حسنة الإنذار .
- D - البيلة البروتينية الانتصابية حسنة الإنذار .
- E - تكون خفيفة في التهاب الكلية الخلالي .

١٦ - في التحال البريتواني المزمن الجوال
C.A.P.D كل مما يلي خطأ ماعدا :

- A - قليل الفائدة عند الأطفال .
- B - يصعب تطبيقه عند السكريين .
- C - نادراً جداً مايسبب التهاب البريتوان .
- D - تكون فعاليته العلاجية الإجمالية عند تطبيقه الجيد مشابهة للتحال الدموي .
- E - يطبق مرتين في الأسبوع فقط .

١٧ - في زراعة الكلية واحد مما يلي صحيح:

- A - يتم استئصال الكليتين الأصليتين
- B - يتم استئصال كلية واحدة
- C - توقف قاععات المناعة بعد سنتين
- D - توقف قاععات المناعة بعد ٥ سنوات
- E - لا دواع لاستخدام قاععات المناعة عند التوائم الحقيقية

١١ - مريض عمره ٣٠ سنة لديه قصور كلوي
مزمن متوسط الشدة ينصح بما يلي ماعدا :

- A - إيقاف التدخين .
- B - الإقلال من تناول ملح الطعام .
- C - إيقاف تناول البروتينات .
- D - الإقلال من تناول الدم المشبعة .
- E - محاولة المحافظة على وزن مثالي .

١٨ - تنكس الامراض التالية بعد زرع الكلية ماعدا

- A - الداء السيستيني
- B - مرض بيرجي
- C - كلية عديدة الكيسات
- D - متلازمة كودبانشتر
- E - التصلب الكبي البؤري

١٢ - في القصور الكلوي المزمن واحد مما يلي صحيح :

- A - قد يكون في البداية لا عرضياً .
- B - شح البول من العلامات المبكرة .
- C - تصبح المعالجة المعاوضة ضرورية عندما تنخفض نسبة تصفية الكرياتينين عن ٣٠ مل / د
- D - الحماية ناقصة البروتينات مضاد استقلاب في التهابات الكبد والكلية البدنية .
- E - إعطاء المسهلات قد يحسن الوظيفة الكلوية .

١٩ - أفضل خافض ضغط عند مرضى اعتلال الكلية
السكري هو :

- A - المدرات .
- B - حاصرات B
- C - ألفا ميتيل دوبا
- D - مثبطات الأنزيم القالب
- E - المشاركة بين المدرات وحاصرات B

١٣ - في القصور الكلوي المزمن واحد مما يلي صحيح:

- A - يرتفع الفوسفور والفسفوريوم .
- B - ينقص الكالسيوم والبوتاسيوم .
- C - يرتفع الفوسفور والبوتاسيوم .
- D - ينقص حمض البول ويرتفع البوتاسيوم .
- E - ترتفع البولة الدموية والكرياتينين والبيكربونات .

٢٠ - في الإصابة الكلوية في سياق الداء السكري كل
مما يلي صحيح ماعدا :

- A - في المراحل الأولى قد تكون تصفية الكرياتينين
مزدادة .
- B - ضبط سكر الدم يؤثر ايجابياً على الإصابة الكلوية
- C - يعتبر ازدياد الكلية مضاد استقلاب
- D - إعطاء المواد الظليلة قد يحدث قصور كلوي حاداً
- E - قد تقلل الحاجة للأنسولين في حال وجود قصور
كلوي مزمن .

١٤ - في القصور الكلوي المزمن واحد مما يلي صحيح:

- A - تنجم الحكة عادة عن فرط البوتاسيوم .
- B - السبب المهم لفقر الدم هو النزوف المتكررة .
- C - تنجم الأعراض العصبية عن نقص الالمنيوم .
- D - تفيد الفصادة الجافة في علاج الحكة .
- E - يمكن إعطاء اللازيكس في وذمة الرئة بكمية
كبيرة

٢١ - في الذئبة الحمامية الجهازية واحد مما يلي
صحيح:

- A - تترافق البيلة البروتينية الشديدة بمتلازمة نفروزي
- B - الإصابة الجلدية تحدد الإنذار
- C - تترافق الحالات الشديدة بزيادة في المتممة
- D - لا يمكن اشراك قاععات المناعة وتبديل البلازما
- E - زرع الكلية مضاد استقلاب

١٥ - من أسباب القصور الكلوي المزمن كل مما يلي
ماعدا :

- A - الحصيات البولية
- B - الداء السيستيني
- C - ارتفاع التوتر الشرياني
- D - البيلة البروتينية الانتصابية
- E - مرض بيرجي

٢٢ - من استطيات التحال الدموي في القصور الكلوي المزمن ما يلي ماعدا :

- A - تصفية كرياتينين أقل من ٥ مل / د .
- B - اختلاجات ناجمة عن نقص الكالسيوم .
- C - ارتفاع بوتاسيوم الدم إلى أكثر من ٧ مك .
- D - الحماض الشديد .
- E - التهاب التامور .

٢٣ - من أسباب القصور الكلوي الحاد كل مايلي ماعدا :

- A - الداء السكري
- B - الاندومييتايس
- C - الحصيات الكلوية
- D - الورم النقي العنيد
- E - حاصرات ألفا

٢٤ - يستطب إعطاء الكورتيزون في مايلي ماعدا :

- A - متلازمة اليورت
- B - الفرفرية التافية
- C - التهاب ماحول الشريان العنيد
- D - الذئبة الحمامية الجهازية
- E - تنادر كود - باشر

٢٥ - من اختلالات الداء السكري كل مايلي ماعدا :

- A - القصور الكلوي الحاد
- B - القصور الكلوي المزمن
- C - سرطان المثانة
- D - تنخر حليمات الكلية
- E - التهاب الحويضة والكلية الحاد

اختر الإجابة الوحيدة الخاطئة :

٦٦) التغييرات الفيزيولوجية التي تحدث أثناء الحمل : A. يزداد حجم البلازما B. تنقص كتلة الكريات الحمراء C. يزداد معدل الرشح الكبلي D. تزداد كتلة الألبومين	٦٧) في داء الكلية عديدة الكيسات عند البالغين : A. تكون الوراثة فيه جسمية متنحية B. يبدأ ظهور الكيسات في نهاية العقد الثاني C. يترافق عادة بارتفاع توتر شرياني D. يترافق بزيادة حدوث الحصيات الكلوية
٦٨) من صفات ارتفاع التوتر الشرياني الحولي : A. يظهر في الثلث الأخير من الحمل B. يختفي بعد الولادة C. يترافق مع ضخامة في عضلة البطين الأيسر D. فحص قعر العين طبيعي	٦٩) من التظاهرات خارج الكلوية اداء الكلية عديدة الكيسات عند البالغين : A. الكيسات الكبدية B. أمهات الدم داخل القحف C. داء الرئوج D. تضيق الدسام الأبهرى
٦٩) خافضات الضغط التي يمكن استعمالها بأمان في الحمل : A. Aldomet B. Hydrochlorothiazide C. Hydralazine D. Labetolol	٧٠) الحالات التي يجب الشك بوجود أفة انبوعية كلوية عند طفل : A. وجود حصيات كلوية B. متلازمة البوال والسهاق C. وجود تشوهات عظمية شبيهة بالكساح D. بول صلبحي عالي الكثافة
٧٠) في تضيق الشريان الكلوي : A. سوء التصنع الليفي العضلي السبب الرئيسي عند النساء الشابات B. التصلب العصيدي السبب الرئيسي عند الرجال المسنين C. التشخيص الأكيد بتصوير أشرايين الظليل D. ارتفاع الضغط الناجم عن التضيق ثنائي الجانب يعالج بمخثرات الانزيم القالب	٧١) في الحمض الأنبوبي الكلوي البعيد : A. حمض أمثلابي عالي الكلور B. نقص بوتاسيوم المصل C. نقص اطراح الكالسيوم في البول D. نقص اطراح السترات في البول
٧١) من الأسباب الكلوية لارتفاع التوتر الشرياني : A. القصور الكلوي B. داء الكلية عديدة الكيسات C. تضيق الشريان الكلوي D. الكلية اسفنجية اللب	٧٢) في البيلة التفهة كلوية المنشأ الولادية : A. تنتقل بصفة وراثية متنحية مرتبطة بالصبغي X B. تكون الإصابية أشد عند الذكور C. يكون البول الصبالي منخفض الكثافة D. تستجيب للعلاج بإعطاء هرمون ADH
٧٢) من الآثار الجانبية للمدرات الثيازيدية : A. زيادة سكر الدم B. نقص مستوى حمض البول في الدم C. زيادة كالسيوم الدم D. زيادة شحوم الدم	٧٣) من أسباب البيلة التفهة كلوية المنشأ المكتسبة : A. نقص كالسيوم الدم B. العلاج بالليثيوم C. الحمل D. بعض أدوية التخدير
٧٣) من التغييرات الفيزيولوجية التي تحدث في الحمل : A. يرتفع ضغط الدم خلال النصف الأول من الحمل B. يظهر فقر دم تمديدي C. يظهر توسع في الحالبين D. ينخفض مستوى الكرياتينين في المصل	٧٤) في متلازمة فانكولي : A. توجد بيلة سكرية B. توجد بيلة بروتينية انبوعية C. تترافق بحمض أنبوبي كلوي بعيد D. من أسبابها الداء النشواني

اختر الإجابة الوحيدة الخاطئة :

٤٦) من أعراض التهاب المثانة الحاد : A. تعدد مرات التبول B. الحمى والعرواءات C. الإلحاح D. عسرة التبول	٤٥) تتصف حصيات فوسفات الكالسيوم : A. قد تكون على شكل هيدروكسي أباتيت B. قد تكون على شكل ستروفييت C. تتشكل في بول قلوي D. تكثر مشاهدتها في الحماض الأنبوبي الكلوي البعيد
٤٧) في التهاب الحويضة والكلية الحاد يظهر فحص البول والراسب : A. بول عكر B. بيلة قيحية C. بيلة اسطوانيات الكريات البيض D. بيلة بروتينية شديدة أكثر من 3 غرامات في اليوم	٤٤) تتصف حصيات اوكزالات الكالسيوم : A. لا يتأثر تشكيلها ب PH البول B. تشكل غالبية الحصيات المرجانية C. من أسبابها فرط اوكزالات البول D. يمكن معالجتها بالتفتيت من خارج الجسم
٤٨) في البيلة الجرثومية اللاعرضية : A. يكثر حدوثها عند العوامل B. يكثر حدوثها عند المسنين C. تشخص بزرع بول ايجابي دون أعراض سريرية D. لا تحتاج للعلاج في جميع الحالات	٤٣) تتصف الحصيات الانشائية : A. سببها الانتان البولي ب E.Coli B. قد تشكل حصيات مرجانية C. تترافق عادة بوجود ركودة بولية D. يفضل علاجها بالاستئصال الجراحي
٤٩) في البيلة القيحية العقيمة : A. فحص الراسب البولي يظهر وجود أكثر من خمس كريات بيض في الساحة المجهرية B. يكون زرع البول سلبيًا C. تشاهد في الكثرن البولي D. تشاهد في الانتان البولي ب Klebsiella	٤٢) تتصف حصيات السيستين : A. تتشكل عند مرضى البيلة السيستينية B. تتشكل في وسط حامضي C. قد تشكل حصيات مرجانية D. لا تظهر أبداً على الصورة الشعاعية البسيطة
٥٠) من أسباب البيلة القيحية العقيمة : A. التهاب الاحليل بالمكورات البنية B. التهاب الحليل بالكلاميديا C. انتان المجاري البولية بالمتقلبات الشائعة D. التكرن البولي	٤١) تتصف حصيات حمض البول : A. تتشكل في وسط حمضي B. يزداد حدوثها عند العلاج الكيميائي للأورام C. تعالج بإعطاء مقلونات البول D. يزداد حدوثها باستعمال مركب Allopurinol
	٤٠) من أسباب الكلاس الكلوي : A. فرط نشاط جارات الدرق الأواي B. الكلية اسفنجية اللب C. الحماض الأنبوبي الكلوي البعيد D. التهاب الحويضة والكلية

