



جامعة طرطوس

كلية الطب البشري

قسم التوليد وأمراض النساء

أسئلة مقرر أمراض النساء لطلاب الطب - السنة الخامسة - ٢٠١٧/٢٠١٨ - مدة
الامتحان سبعون دقيقة
أحمد غنوم

١- يعد كل مما يلي من اختلاطات اللولب عدا: a- النزف الطمثي b- الانتان c- انتقاب الرحم d- خطر التهاب وريد خثري	٢- أي مما يلي يعد السبب الأكثر شيوعاً للعقم: a- الأندوميتريوز b- العقم غير المفسر c- شذوذات الرحم d- مشاكل الجماع
٣- منع الحمل الإسعافي ما يلي صحيح عدا: a- يمكن استخدام حبوب منع الحمل المركبة b- يمكن استخدام الحبوب الحاوية على البروجسترون فقط c- يمكن استخدام اللولب النحاسي d- تعد الحبوب أكثر فعالية من اللولب النحاسي	٤- كل ما يلي يقترح دوراً للأستروجين في نمو الورم الليفي عدا: a- غياب الورم الليفي قبل البلوغ b- نموه السريع بعد سن الضهي c- إمكانية نموه السريع خلال الحمل d- تأثير GnRH agonists بإنقاصها حجم الورم، فهي تحدث نقص أستروجين
٥- الأدينوميوز، كل ما يلي صحيح عدا: a- يؤدي لضخامة شاملة في الرحم b- أكثر شيوعاً عند عديمة الولادة c- قد يتظاهر بنزف طمثي d- قد يترافق مع ورم ليفي أو أندوميتريوز	٦- الأعراض المميزة للأندوميتريوز ما يلي عدا: a- عسرة الطمث b- النواسير المثانية المهبليّة c- عسرة الجماع d- العقم
٧- العرض الأكثر شيوعاً للورم الليفي هو: a- الألم b- انحباس البول c- النزف الرحمي الشاذ d- الإمساك	٨- من أسباب عسرة الطمث الثانوية: a- الأدينوميوز b- الأندوميتريوز c- الأورام الليفيّة d- كل ما سبق صحيح
٩- مريضة ٤٤ عام، في سوابقها أربعة ولادات، تشكو نزف طمثي مع عسرة طمث، أظهر الفحص ضخامة رحمية شاملة (تعادل ١٣ أسبوعاً حملياً)، والرحم أملس رخو، وأظهر الإيكو سماكة في الجدار الخلفي مقارنة مع الأمامي، دون وجود كتل في الرحم أو الملحقات، ما التشخيص الأكثر احتمالاً: a- الورم الليفي الرحمي b- الأدينوميوز c- ورم مبيضي d- سرطان عنق رحم	١٠- علاقة الورم الليفي والحمل، كل ما يلي صحيح عدا: a- قد يؤدي إلى زيادة في نسبة الإسقاط العفوي b- قد يزيده في خطر حدوث المخاض الباكر c- قد يشكل عائقاً أمام الولادة الطبيعية d- تزيد نسبة القيصرية عند مريضات الورم الليفي وعند إجرائها يتم استئصال الورم الليفي بنفس الوقت
١١- تتداخل الأدوية التالية في عمل حبوب منع الحمل الفموية المركبة عدا: a- Sytamol b- Barbiturates c- Sulphonamides d- Rifampicin	١٢- الاستحالة الأكثر شيوعاً التي تصيب الورم الليفي من بين الآتي، هي: a- الاستحالة الهيباليينية b- الاستحالة الكيسية c- الاستحالة المخاطية d- الاستحالة الخبيثة

١٣- لا يشمل استئطاب تصوير الرحم الظليل واحداً مما يلي: a- العقم الثانوي b- استئصاء مرجلات (بوليب) بطانة الرحم c- استئصاء الحاجز ضمن الرحم d- استئصاء أورام المبيض السليمة	١٤- من فوائد اللصاقة المانعة للحمل ما يلي عدا: a- تحافظ مستخدمتها على نشاطها الطبيعي b- تعد اللصاقة مستقلة عن الجماع c- لا تحتاج لانتباه يومي d- تحمي من الأمراض المنقولة بالجنس STDs
١٥- تعود الآثار الجانبية الآتية إلى المكون الأستروجيني لحبوب منع الحمل المركبة عدا: a- توتر الثديين b- قناع الحمل c- العد d- زيادة خطر الخثار	١٦- يشكل ما يلي مضاد استئطاب مطلق لموانع الحمل القموية المركبة عدا: a- سوابق احتشاء عضلة قلبية b- التدخين عند سيدة بعمر أقل من ٣٥ عام c- الخثار الشرياني الوريدي d- سرطان الثدي
١٧- مريضة عدم انتقاب غشاء البكارة، لا تتظاهر أبداً بواحد مما يلي: a- انقطاع طمث بدني b- كتلة بطنية c- انقطاع طمث ثانوي d- تقبب غشاء البكارة	١٨- من بين الآتي ما هو السبب الأكثر ندرة لحدوث تنادر أشرمان: a- سل باطن الرحم b- تجريف رحم تالي لإسقاط c- تجريف رحم تالي للولادة d- الالتصاقات التالية للقيصرية
١٩- مضادات استئطاب اللولب ما يلي عدا: a- الحمل b- الإنتان c- التحسس على النحاس (لولب نحاسي) d- النزف الطمثي (لولب بروجستروني)	٢٠- الآلية الأساسية المانعة للحمل للحبوب المركبة: a- تبدلات ضمورية في بطانة الرحم b- تبدل في مخاط عنق الرحم c- تثبيط الإباضة d- تبدل في حركية البوقين
٢١- أشيع أسباب انقطاع الطمث الثانوي هو: a- تنادر أشرمان b- الحمل c- فرط بروجسترون الدم d- المبيض متعدد الكيسات	٢٢- عسرة الطمث البدينية، ما يلي صحيح عدا: a- يبدأ الألم قبل الطمث بثلاثة أيام b- يكون الألم ماغصاً قولنجياً c- يتوضع الألم عادةً فوق العانة d- لا توجد إمراضية واضحة تفسرها
٢٣- آلية تأثير اللولب النحاسي ما يلي عدا: a- يعد النحاس سام وقاتل للنطاف b- يمنع الإباضة c- يحدث تفاعلاً التهابياً عقيماً يمنع التعشيش d- يتداخل في نقل النطاف وللنحاس تأثير سمي على البيضة	٢٤- محاسن اللولب الحاوية على البروجستين ما يلي عدا: a- فعالة لمدة 5 سنوات للجهاز الواحد b- تفيد في علاج النزف الطمثي c- تعود الخصوبة بنزع الجهاز d- يمكن استخدامها كمانع حمل إسعافي
٢٥- فيما يخص الاستحالة الحمراء للورم الليفي الرحمي خلال الحمل، كل ما يلي صحيح عدا: a- عادة ما تحدث في أواخر الحمل b- تتظاهر بالألم يترافق بغثيان وإقياء c- يعتمد العلاج على فتح البطن d- يؤدي لارتفاع خفيف في الحرارة	٢٦- توقيت تركيب اللولب ما يلي صحيح عدا: a- يوضع بعد الولادة مباشرة عند المرضع b- يوضع في أي وقت من الدورة بعد توثيق غياب الحمل c- يمكن أن يوضع مباشرة بعد إسقاط عفوي d- يمكن أن يوضع مباشرة بعد إجهاض محرض
٢٧- تدبير الورم الليفي، ما يلي صحيح عدا: a- عند وضع التشخيص يتم العلاج فوراً b- خشية الاستحالة الخبيثة c- يمكن استخدام شادات GnRh لإنقاص حجم الورم قبل الجراحة d- تستطخ خزعة باطن الرحم في حالة النزف الرحمي الشاذ المرافق للورم الليفي e- يجري تعداد عام لتقصي فقر الدم بعوز الحديد وإعطاء العلاج المعاوز	٢٨- تتميز حبوب منع الحمل القموية المركبة أحادية الطور بما يلي عدا: a- احتوائها على كميتين مختلفتين من نفس المركب الأستروجيني والبروجستروني b- تتميز باحتوائها على جرعة ثابتة من المركبين c- تؤخذ بشكل يومي لمدة ثلاثة أسابيع d- يمكن أن تؤدي لنقص في كمية الطمث

٢٩- من محاسن ديبوميديروكسي بروجسترون أسيئات DMPA ما يلي عدا: a- يعطي فعالية لمدة ١٢ أسبوعاً في الحقنة b- ينقص من خطر سرطان باطن الرحم c- مستقل عن الجماع d- لا يستخدم خلال الإرضاع	٣٠- فيما يخص تناثر ما قبل الطمث كل ما يلي صحيح عدا: a- تكون الأعراض دورية ومعاودة b- تتفاقم الأعراض عند اللواتي يتناولن موانع الحمل الفموية c- تبدأ الأعراض خلال الطور اللوتينيني d- تتحسن خلال ٤ أيام التي تلي بدء الطمث
٣١- الورم الليفي الرحمي كل ما يلي صحيح عدا: a- هو ورم سليم b- يعد السبب الأكثر شيوعاً لكثرة في الرحم c- يحاط بمحفظة كاذبة d- يكون مفرد دائماً	٣٢- واحداً مما يلي يتداخل في إمراضية سرطان عنق الرحم: a- Gonorrhoeae b- Trichomonas c- HPV d- Chlamydia
٣٣- واحد مما يلي يجري عند سيدة بعمر ٦٠ عام تشكو نزفاً رحمياً: a- عيار الأسترايول b- عيار BHCG c- طبقي محوري للحوض d- تنظير باطن رحم مع تجريف رحم	٣٤- يكون علاج المشعرات المهبلية بـ: a- Nystatine b- Clindamycin c- Metronidazole d- Acyclovir
٣٥- عقم عند سيدة ٣٠ عام قد يكون السبب الآتي عدا: a- انسداد بوقين b- أندومتريوز c- التصاقات رحمية d- إسقاطات متكررة في سياق تناثر الفوسفوليبيد	٣٦- تستطب الفحوص التالية في التهابات الملحقات الحاد عدا: a- بيض وصيغة b- سرعة تنقل، CRP c- صورة ظلية للرحم والملحقات d- عينات للفحص (عنق، مهبل، بول)
٣٧- ينجم النزف عقب الجماع عن: a- ورم ليفي في جدار الرحم b- سرطان عنق رحم c- ورم مبيضي d- سرطان باطن رحم	٣٨- الفحص المؤكد لسرطان باطن الرحم هو: a- الفحص السريري b- الإيكوغرافي الحوضي c- تصوير الرحم الظليل d- تجريف الرحم مع فحص تشريح مرضي
٣٩- عوامل الخطر لسرطان باطن الرحم ما يلي عدا: a- البدانة b- سن ضهي متأخر c- عديدة الولادة d- سن البلوغ المبكر	٤٠- العقابيل الممكنة لالتهاب ملحقات حاد الآتي عدا: a- إنتان بولي مزمن b- حمل خارج الرحم c- عقم أنبوبي d- آلام حوضية مزمنة
٤١- ضائعات مهبلية بيضاء، قشدية مع حرقلة مهبلية وحكة تحدث بسبب: a- مشعرات مهبلية b- مبيضات بيض c- حرقص d- عقبول بسيط نمط II	٤٢- نزف طمثي مؤلم عند سيدة بعمر ٣٥ عام، التشخيص المحتمل هو: a- ورم ليفي تحت مخاطي b- ضمور بطانة رحم c- ورم ليفي تحت مصلي d- التصاقات رحمية
٤٣- بوليبيات باطن الرحم كل ما يلي صحيح عدا: a- تكون دوماً عرضية b- قد تسبب نزفاً رحمياً شاذاً c- يوضع التشخيص بتنظير باطن الرحم d- يجري التشريح المرضي للبوليبيات المستأصلة	٤٤- تنظير باطن الرحم التشخيصي أو العلاجي ما يلي صحيح عدا: a- أحد طرق علاج الحاجز الرحمي b- يستطب قبل محاولات الـ IVF c- يستطب في الأورام الليفية تحت المصلية d- يمكن للتنظير التشخيصي أن يجري بدون تخدير أو تحت تخدير موضعي

٤٥- التهاب المهبل الفطري، كل ما يلي صحيح عدا: a- يعد Nystatin أحد العلاجات الفعالة b- قد نجد حالات حملة غير عرضية c- بالفحص يشاهد ضائعات بيضاء d- تقل مشاهدته خلال الحمل	٤٦- يمكن لأحد الأدوية التالية أن يحدث فرط بروتين الدم ما هو: a- Cabergoline b- Pergolide c- Methyldopa d- Bromocriptine
٤٧- فرط تصنع بطانة الرحم، ما يلي صحيح عدا: a- يزداد حدوثه عند مريضات المبيض متعدد الكيسات b- يكثر عند المصابات بورم مفرز للأستروجين c- النمط الغدي الكيسي لا يتحول إلى الخباثة أبداً d- يعد فرط التصنع المركب مع لانموجية خلوية آفة ما قبل سرطانية	٤٨- تناذر المبيض متعدد الكيسات، كل ما يلي صحيح عدا: a- تعد ندرة الإباضة أحد معايير التشخيص b- يعد فرط الأندروجين أحد معايير التشخيص c- يعد مظهر المبيض بالإيكوغرافي معياراً أساسياً للتشخيص d- يتطلب وضع تشخيص المبيض متعدد الكيسات وجود ثلاثة معايير
٤٩- يشاهد انقطاع الطمث الثانوي بدون نقص بالأستروجين في الحالات الآتية عدا: a- المبيض متعدد الكيسات b- متلازمة شيهان c- الحمل d- متلازمة أشرمان	٥٠- كل ما يلي من أسباب النزف بعد سن الضهي عدا: a- سرطان باطن الرحم b- قصور الجسم الأصفر c- العلاج بالأستروجين d- التهاب باطن رحم ضموري
٥١- من الآثار الجانبية لموانع الحمل الفموية ما يلي عدا: a- الغثيان b- العذ c- نقص الوزن d- الاكتئاب	٥٢- يشكل كل ما يلي عامل خطر لسرطان عنق الرحم ما عدا: a- الجماع الباكر b- سوء المستوى الاجتماعي الاقتصادي c- عديمت الولادة d- الحمل المبكر
٥٣- تتضمن آليات تأثير الأندوميتريوز على الخصوبة بما يلي عدا: a- تضيق البوق عند بدايته b- إعاقة حركة البوق c- التأثير على نوعية البويض d- الزيادة في حدوث متلازمة المبيض متعدد الكيسات	٥٤- يوضع تشخيص الالتصاقات ضمن الرحم بـ: a- تنظير البطن b- تنظير باطن الرحم c- تصوير طبقي محوري d- تنظير عنق رحم مكبر
٥٥- يُشاهد انقطاع الطمث مع مخطط حرارة وحيد الطور في: a- تناذر أشرمان b- حجاب مهلي معترض c- عدم انتقاب غشاء بكارة d- سن ضهي مبكر	٥٦- من الاستقصاءات التي تجرى في العيادة ما يلي عدا: a- مسحة من عنق الرحم والمهبل b- تنظير باطن رحم تشخيصي c- تنظير بطن d- إيكوغرافي

٥٧- يمكن أن يُشاهد في تناذر ما قبل الطمث ما يلي عدا: a- انتفاخ بطن b- صداع c- كسب الوزن d- تباعد طموث	٥٨- أسباب النزف الرحمي الشاذ التي يشار لها اختصاراً PALM تكون بسبب الآتي عدا: a- البوليبيات (المرجلات) b- الأدينوميوز c- قصور طور لوتينيني d- الخبائة e- الورم الليفي
٥٩- تترافق التناذرات التالية نموذجياً مع انقطاع طمث بدني عدا: a- Kallman b- Asherman c- Turner d- Rokitanski	٦٠- الفحص الأكثر ملائمة لتقييم المخزون المبيضي هو: a- عيار البرولاكتين b- عيار FSH, LH c- عيار AMH d- عيار الأستروجين
٦١- من استبطابات تنظير باطن الرحم ما يلي عدا: a- فشل التعشيش b- العقم غير المفسر c- الالتصاقات ضمن الرحم d- فرط برولاكتين الدم	٦٢- من محاسن الحلقة المهبليّة المانعة للحمل ما يلي عدا: a- يبدأ تأثيرها المانع للحمل ابتداءً من اليوم الأول لاستخدامها b- يجب نزعها أثناء الجماع c- يحدث استئناف سريع للخصوبة بعد إيقافها d- يمكن أن توضع من قبل المريضة نفسها
٦٣- تتصف حبوب منع الحمل البروجسترونية بما يلي عدا: a- تزيد في سماكة مخاط عنق الرحم b- تحدث تبدلات ضمورية في بطانة الرحم تمنع التعشيش c- تؤثر على أهذاب وحركية البوقين d- للحفاظ على التأثير المانع للحمل تعطى لمدة ثلاثة أسابيع مع انقطاع أسبوع، ثم معاودة وهكذا دواليك	٦٤- الطمث المولم مع النزف الطمثي هو: a- Oligomenorrhea- amenorrhea b- Dysmenorrhea- menorrhagia c- Menarche- thelarche d- Oligomenorrhea- menopause

انتهت الأسئلة

مع التمنيات بالتوفيق

مدرس المقرر

د. عدنان ابراهيم محمد

يخرج النشر في المكتبات